

## Agiflex 20 Ampoules

EAN: 5605481101199    FABRICANTE: DIETMED



AGIFLEX est un complément alimentaire à base de Chondractiv™ (contient 55 % de collagène de type II, 12 % de sulfate de chondroïtine et 2 % d'acide hyaluronique), c'est-à-dire une combinaison brevetée d'éléments ayant une action chondroprotective marquée.

### LA DESCRIPTION

#### A quoi sert Agiflex ?

Pour l'entretien du cartilage.

Il aide à lubrifier les articulations et à les maintenir flexibles.

#### Quand est-il indiqué de prendre Agiflex ?

Dans les cas de :

- Douleur.
- Raideur articulaire.
- Usure cartilagineuse.
- Limitation du mouvement.
- Déformations.
- Des crépitements.

### Ingrédients

Eau, fructose, concentré de raisin, collagène marin hydrolysé\*, sulfate de chondroïtine\*, Chondractiv™ (contenant 55 % de collagène de type II, 12 % de sulfate de chondroïtine et 2 % d'acide hyaluronique), acide L-ascorbique, bioflavonoïdes, hyaluronate de sodium, arôme orange, régulateur d'acidité : acide citrique, conservateur : sorbate de potassium, naringine. \*Produit à base de poisson.

#### Composition Pour 1 ampoule :

- Chondractiv™ 250 mg (contenant 55 % de collagène de type II, 12 % de sulfate de chondroïtine et 2 % d'acide hyaluronique).



## Agiflex 20 Ampoules

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



- Collagène total 900 mg.
- Sulfate total de chondroïtine 300 mg.
- Acide hyaluronique total 45 mg.
- Vitamine C 120 mg (150% VNR\*).
- Bioflavonoïdes 100 mg.
- Naringine 10 mg.

\*Valeur de référence des nutriments.

Goût d'orange.

### Mode d'emploi

1 ampoule par jour, de préférence avant le petit-déjeuner. Il peut être dissous dans de l'eau ou du jus de fruit.

### Contre-indications

Déconseillé en cas de grossesse et d'allaitement.

L'utilisation doit être évitée chez les asthmatiques.

La consommation de chondroïtine doit également être évitée chez les patients ayant eu ou présentant une récurrence d'un cancer de la prostate.

### Interactions médicamenteuses et autres

Des effets indésirables minimes ont été décrits pour le collagène, principalement des inconforts gastro-intestinaux, tels qu'une sensation de satiété et un goût désagréable, ainsi que des maux de tête. Le sulfate de chondroïtine est sans danger pour la plupart des gens. Dans certains cas, cela peut provoquer des douleurs gastriques et des nausées. D'autres effets indésirables tels que la diarrhée, la constipation, le gonflement des paupières, des jambes enflées, la perte de cheveux et un rythme cardiaque irrégulier ont été rapportés. Des précautions doivent être prises lors de l'association de chondroïtine avec de la warfarine (anticoagulant), car cela augmente le risque de saignement.

