



Le magnésium contribue au maintien des os dans des conditions normales et au maintien d'une fonction musculaire normale.

LA DESCRIPTION

A quoi sert Agiflex ?

Pour l'entretien du cartilage.

Il aide à lubrifier les articulations et à les maintenir flexibles.

Quand est-il indiqué de prendre Agiflex ?

Dans les cas de :

- Douleur.
- Raideur articulaire.
- Usure cartilagineuse.
- Limitation du mouvement.
- Déformations.
- Des crépitements.

Ingrédients

Maltodextrine, collagène Peptiplus XP, citrate de magnésium, Chondractiv™ (contenant 55 % de collagène de type II, 12 % de sulfate de chondroïtine et 2 % d'acide hyaluronique), arôme orange, acide L-ascorbique, correcteur d'acidité : acide citrique, hyaluronate de sodium, sulfate de chondroïtine* , édulcorant : sucralose, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine. *Produit à base de poisson.

Composition

Pour 1 doseur (10 g) : Chondractiv™ 250 mg, Collagène 3000 mg, Acide Hyaluronique 25 mg, Sulfate de Chondroïtine 50 mg, Vitamine B1 1,1 mg (100% VRN*), Vitamine B2 1,4 mg (100% VNR*), Vitamine B6 1,4





mg (100% VNR*), Acide pantothénique 6 mg (100% VNR*), Vitamine C 80 mg (100% VNR*), Magnésium 56,25 mg (15% VNR*). *Valeur nutritionnelle de référence.

Mode d'emploi

1 mesure (10 g) par jour, à dissoudre dans un demi-verre d'eau, de thé ou de jus de fruit.

Contre-indications

Déconseillé en cas de grossesse et d'allaitement.

L'utilisation doit être évitée chez les asthmatiques.

La consommation de chondroïtine doit également être évitée chez les patients ayant eu ou présentant une récurrence d'un cancer de la prostate.

Interactions médicamenteuses et autres

Des effets indésirables minimes ont été décrits pour le collagène, principalement des inconforts gastro-intestinaux, tels qu'une sensation de satiété et un goût désagréable, ainsi que des maux de tête. Le sulfate de chondroïtine est sans danger pour la plupart des gens. Dans certains cas, cela peut provoquer des douleurs gastriques et des nausées. D'autres effets indésirables tels que la diarrhée, la constipation, le gonflement des paupières, des jambes enflées, la perte de cheveux et un rythme cardiaque irrégulier ont été rapportés. Des précautions doivent être prises lors de l'association de chondroïtine avec de la warfarine (anticoagulant), car cela augmente le risque de saignement.

