

## Tensicor 60 Comprimés

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



Complément alimentaire pour l'hypertension artérielle et pour un système cardiovasculaire sain.

### LA DESCRIPTION

#### Dans quel cas Tensicor est-il indiqué ?

- Pour maintenir une tension artérielle saine.
- Modulateur actif pour une circulation sanguine saine.
- Hypertension artérielle.

### Ingrédients

*Olea europaea* (Olive ; extrait de feuille d'olivier EFLA 943®), *Crataegus oxyacantha* (Aubépine ; extrait concentré contenant au moins 18,75% d'OPC), *Allium sativum* (Ail ; extrait sec 3:1), acide L-ascorbique, agent de charge : cellulose microcristalline , antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras, D-alpha-tocophérol 50%, antiagglomérant : dioxyde de silicium, sélénite de sodium.

### Composition

Pour 2 comprimés : EFLA 943® Extrait de Feuille d'Olivier 700 mg, Ail (1% alliéine) 500 mg, Aubépine (18,75% OPC) 400 mg, Vitamine C 100 mg (125% VNR\*), Vitamine E 12 mg  $\alpha$ -TE ( 100% VRN\*), Sélénium 55  $\mu$ g (100% VRN\*). \*Valeur de référence des nutriments.

### Mode d'emploi

1 comprimé 2 fois par jour, de préférence après les repas.

### Contre-indications

Ne pas utiliser en cas de grossesse et d'allaitement.

Une consommation excessive d'aubépine peut provoquer une dépression respiratoire et cardiaque. Il ne doit pas être utilisé pendant les 3 premiers mois de grossesse, ni chez les enfants de moins de 6 ans.

Une consommation excessive d'ail peut provoquer des irritations gastro-intestinales, des réactions



## Tensicor 60 Comprimés

EAN: 5605481108501    FABRICANTE: DIETMED



allergiques et augmenter le risque de saignement. L'ail est contre-indiqué en cas d'hémorragie active, en pré et postopératoire, ainsi qu'en cas de thrombocytopénie. Vous devez éviter de consommer de la vitamine E et de la vitamine C en cas d'angioplastie. Une consommation excessive de vitamine E peut provoquer des saignements. Une consommation excessive de sélénium peut provoquer des symptômes tels que perte de cheveux, stries blanches sur les ongles, fatigue, irritabilité et goût métallique.

### Interactions médicamenteuses et autres

En raison de la présence d'Aubépine, elle ne doit pas être associée à des hétérosides cardiotoniques, des bêtabloquants, des agents hypotenseurs ou des benzodiazépines. En raison de la présence d'ail, il ne doit pas être associé aux anticoagulants, aux agents antiplaquettaires, aux contraceptifs oraux et aux médicaments métabolisés par le foie. La vitamine E interagit avec les médicaments métabolisés par le foie. Le sélénium peut interagir avec les médicaments hypotenseurs, les sédatifs et la warfarine.

