

Xylitol Pot de chewing-gum saveur pastèque 30 unités

EAN: 4250107657836 FABRICANTE: MIRADENT



Il a été démontré que mâcher de la gomme sucrée à 100 % au xylitol réduit la plaque dentaire. Une plaque dentaire abondante est un facteur de risque de développement de caries chez les enfants. L'effet positif est obtenu si 2 à 3 g de gomme sucrée à 100 % avec du xylitol sont consommés au moins 3 fois par jour après les repas.

LA DESCRIPTION

Gomme sans sucre au xylitol

- 100% édulcoré au xylitol.
- Sans aspartame, sorbitol, lactose.
- Contribue à la minéralisation des dents*.
- Réduit le risque de caries chez les enfants**.
- Réduit la plaque dentaire**.

*L'effet positif est obtenu en mâchant du chewing-gum contenant du xylitol pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. (Manger des aliments contenant du xylitol au lieu du sucre aide à maintenir la minéralisation des dents.)

**Il a été démontré que mâcher de la gomme sucrée à 100 % au xylitol réduit la plaque dentaire. Une plaque dentaire abondante est un facteur de risque de développement de caries chez les enfants. L'effet positif est obtenu si 2 à 3 g de gomme sucrée à 100 % avec du xylitol sont consommés au moins 3 fois par jour après les repas.

Ingrédients Pastèque : édulcorant : xylitol, gomme base, arôme, régulateur d'acidité : acide malique, acide citrique, colorant : carbonate de calcium, épaississant : gomme arabique, humectant : glycérine, émulsifiant : lécithine (tournesol), agent d'enrobage de cire : carnauba. la cire.

Information nutritionnelle:

Pastèque pour 100g par gomme (1g)

Énergie 720 kJ / 172,8 kcal 7,20 kJ / 1,72 kcal



Xylitol Pot de chewing-gum saveur pastèque 30 unités

EAN: 4250107657836 **FABRICANTE:** MIRADENT



Glucides / Koolhydrates 72 g 0,72 g

Notes : Chewing-gum avec édulcorant. Une consommation excessive peut avoir un effet laxatif ! Faites attention à une alimentation équilibrée et variée et à un mode de vie sain.

Quantité quotidienne recommandée : Adultes 1 à 10 pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans (risque d'étouffement en cas d'ingestion). Danger pour la vie des animaux domestiques.

