

Gel Nodacil 15 ml x 10 Enveloppes

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Soulagement rapide et efficace des symptômes liés à l'acidité gastrique.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que Nodacil ?

C'est un complément alimentaire à base de Magnésium avec édulcorants.

A quoi sert Nodacil ?

Nodacil Gel contient du magnésium qui contribue à l'équilibre électrolytique, il est donc utile pour l'acidité gastrique.

Comment prendre Nodacil ?

Prendre un sachet entre 30 et 60 minutes après les repas principaux.

Dose journalière recommandée : 1 à 2 sachets.

Agiter avant d'ouvrir.

Avantages de prendre Nodacil

La sensation de brûlures d'estomac après les repas est provoquée par le reflux du contenu gastrique, qui est acide, dans l'œsophage (un organe non préparé à contenir des acides).

Cela se produit en raison d'une défaillance du mécanisme de barrière qui sépare l'œsophage de l'estomac. Les facteurs qui favorisent un mauvais fonctionnement du sphincter inférieur de l'œsophage sont nombreux et variés, comme la position couchée après avoir mangé, l'obésité, le tabac et l'alcool, les repas copieux, le stress, le port de vêtements serrés à la taille, certains médicaments, certaines maladies comme hiatales, hernie et certains aliments comme le café, le thé, le cola, les boissons gazeuses, le chocolat, la menthe, les agrumes, l'ail, le poivre...

Nodacil Gel est votre soulagement rapide et efficace des symptômes liés à l'acidité gastrique.

De quoi est composé Nodacil ?

Nodacil Gel contient des sels de magnésium (carbonate de magnésium et trisilicate de magnésium), des sels de calcium (carbonate de calcium), de l'alginate de sodium, des pectines, de la gomme xanthane et de l'huile essentielle de menthe poivrée.



Gel Nodacil 15 ml x 10 Enveloppes

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Ingrédients

Eau, Agent de charge (trisilicate de magnésium), Carbonate de magnésium, Régulateur d'acidité (carbonate de calcium), Amidon de maïs modifié, Gélifiants (cellulose microcristalline, carboxyméthylcellulose, pectine, gomme xanthane, alginate de sodium), Huile essentielle de menthe poivrée, Édulcorants (acésulfame K, sucralose), Conservateurs (benzoate de sodium, sorbate de potassium).

Ingrédients actifs

Pour 1 sachet :

Magnésium : 125 mg (33% VNR*).

Pour 2 enveloppes :

Magnésium : 250 mg (66% VNR*).

*VNR : Valeurs Nutritives de Référence.

Précautions

Ne prenez pas ce complément alimentaire si vous êtes allergique ou intolérant à l'un de ses ingrédients. Son utilisation est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement.

Séparez la prise de Nodacil Gel de la prise de médicaments, pendant au moins 1 heure.

Prendre le produit avec beaucoup d'eau pour garantir que la substance atteigne l'estomac. Avertissement de danger d'étouffement pour les personnes ayant des problèmes de déglutition. Évitez de consommer avec des médicaments et autres compléments alimentaires à base de fibres.

