

## Babybiane Imédia 7 Enveloppes

EAN: 3701145600076 FABRICANTE: PILEJE



Babybiane Imédia est un ferment lactique de Pileje. Babybiane est utilisé pour traiter les diarrhées aiguës du nourrisson, qu'il s'agisse d'une gastro-entérite aiguë ou d'une diarrhée liée à la prise d'antibiotiques. Babybiane Imédia est indiqué pour les enfants de 0 à 4 ans.

### LA DESCRIPTION

**Babybiane Imedian** est un complément alimentaire de **Pileje**, utilisé pour le traitement de **la gastro-entérite aiguë** et **des diarrhées** associées à **la prise d'antibiotiques** chez les nourrissons et les enfants jusqu'à quatre ans, toujours sur recommandation médicale.

**Ingrédients de Babybianes Imedian Pileje** : Maltodextrine, et une souche microbienne dosée à 10 milliards par sachet : *Lactobacillus rhamnosus* GG LA801.

### Analyse nutritionnelle de Babybiane Imédia

	Analyse moyenne	Par 100g Au-dessus de	
Valeur énergétique	(kJ)	1659	25
Valeur énergétique	(kcal)	390	6
Matière grasse	(g)	< 0,5	0
_dont acides gras saturés	(g)	0	0
Les glucides	(g)	93	1.4
_dont les sucres	(g)	3.4	< 0,5
Protéines	(g)	3.6	< 0,5
Sel	(g)	0,62	< 0,01

La liste des ingrédients et les valeurs analytiques peuvent changer et sont données sur la base des informations dont nous disposons à ce moment-là.

Avant d'utiliser un produit PiLeJe, vérifiez l'emballage pour vous assurer que sa composition est adaptée à votre usage personnel.



## Babybiane Imédia 7 Enveloppes

EAN: 3701145600076    FABRICANTE: PILEJE



### Comment utiliser Bébé Imédia

1 sachet par jour, dilué dans un biberon ou un verre de 150 à 200 ml d'une boisson froide ou tiède, ou mélangé à un aliment adapté à l'enfant. Prendre de préférence avant un repas.

**Précautions de Babybiane Imédia :** Babybiane Imédia ne doit être utilisé que sous contrôle médical. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions. Cela ne peut pas être la seule source d'énergie. Il ne peut pas être utilisé par voie parentérale. Il a été spécifiquement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des jeunes enfants (jusqu'à 4 ans inclus) qui souffrent de diarrhée aiguë (causée par une gastro-entérite aiguë ou la prise d'antibiotiques).

