



AGIFLEX è un integratore alimentare a base di Chondractiv™ (contiene 55% Collagene di Tipo II, 12% Condrotin Solfato e 2% Acido ialuronico), ovvero una combinazione brevettata di elementi a spiccata azione condropottive.

### DESCRIPCIÓN

#### A cosa serve Agiflex?

Per il mantenimento della cartilagine.

Aiuta a lubrificare le articolazioni e mantiene le articolazioni flessibili.

#### Quando è indicato assumere Agiflex?

Nei casi di:

- Dolore.
- Rigidità articolare.
- Usura della cartilagine.
- Limitazione del movimento.
- Deformazioni.
- Crepitio.

### Ingredienti

Acqua, fruttosio, concentrato di uva, collagene marino idrolizzato\*, condroitin solfato\*, Chondractiv™ (contenente 55% collagene di tipo II, 12% condroitin solfato e 2% acido ialuronico), acido L-ascorbico, bioflavonoidi, ialuronato di sodio, aroma di arancia, correttore di acidità: acido citrico, conservante: sorbato di potassio, naringin. \*Prodotto a base di pesce.

#### Composizione Per 1 fiala:

- Chondractiv™ 250 mg (contenente 55% collagene di tipo II, 12% condroitin solfato e 2% acido ialuronico).





- Collagene totale 900 mg.
- Condroitin solfato totale 300 mg.
- Acido ialuronico totale 45 mg.
- Vitamina C 120 mg (150% VNR\*).
- Bioflavonoidi 100 mg.
- Naringina 10 mg.

\*Valore di riferimento dei nutrienti.

Sapore d'arancia.

### Istruzioni per l'uso

1 fiala al giorno, preferibilmente prima di colazione. Può essere sciolto in acqua o succo di frutta.

### Controindicazioni

Sconsigliato in caso di gravidanza e allattamento.

L'uso dovrebbe essere evitato negli asmatici.

Il consumo di condroitina dovrebbe essere evitato anche nei pazienti che hanno avuto o stanno avendo una recidiva di cancro alla prostata.

### Interazioni farmacologiche e altro

Sono stati descritti effetti avversi minimi per il collagene, principalmente alcuni disturbi gastrointestinali, come sensazione di pienezza, sapore sgradevole e mal di testa. Il solfato di condroitina è sicuro per la maggior parte delle persone. In alcuni casi può causare dolore gastrico e nausea. Sono stati segnalati altri effetti avversi come diarrea, stitichezza, palpebre gonfie, gambe gonfie, perdita di capelli e battito cardiaco irregolare. È necessario prestare attenzione quando si associa la condroitina al warfarin (anticoagulante), poiché aumenta il rischio di sanguinamento.

