

## Agiflex 40 Capsule

EAN: 5605481107306 FABRICANTE: DIETMED



La vitamina C contribuye a la normal formación del colágeno para la normal función de los cartilagos.

### DESCRIPCIÓN

#### A cosa serve Agiflex?

Per il mantenimento della cartilagine.

Aiuta a lubrificare le articolazioni e mantiene le articolazioni flessibili.

#### Quando è indicato assumere Agiflex?

Nei casi di:

- Dolore.
- Rigidità articolare.
- Usura della cartilagine.
- Limitazione del movimento.
- Deformazioni.
- Crepitio.

### Ingredienti

Chondractiv™ (contenente 55% collagene di tipo II, 12% condroitin solfato e 2% acido ialuronico), agente di carica: cellulosa microcristallina, collagene marino\*, gelatina, acido L-ascorbico, quercetina, ialuronato di sodio, condroitina solfato\*, naringina, anti -agenti agglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, anidride carbonica silicio.

### Composizione

Per 2 capsule: Chondractiv™ 500 mg, collagene 500 mg, acido ialuronico 50 mg, condroitin solfato 100 mg, vitamina C 80 mg (100% VRN\*), quercetina 60 mg, naringina 20 mg. \*Valore di riferimento dei nutrienti.



## Agiflex 40 Capsule

EAN: 5605481107306 FABRICANTE: DIETMED



### Istruzioni per l'uso

1 capsula 2 volte al giorno, preferibilmente prima di colazione e prima di cena.

### Controindicazioni

Sconsigliato in caso di gravidanza e allattamento.

L'uso dovrebbe essere evitato negli asmatici. Il consumo di condroitina dovrebbe essere evitato anche nei pazienti che hanno avuto o stanno avendo una recidiva di cancro alla prostata.

### Interazioni farmacologiche e altro

Sono stati descritti effetti avversi minimi per il collagene, principalmente alcuni disturbi gastrointestinali, come sensazione di pienezza, sapore sgradevole e mal di testa. Il solfato di condroitina è sicuro per la maggior parte delle persone. In alcuni casi può causare dolore gastrico e nausea. Sono stati segnalati altri effetti avversi come diarrea, stitichezza, palpebre gonfie, gambe gonfie, perdita di capelli e battito cardiaco irregolare. È necessario prestare attenzione quando si associa la condroitina al warfarin (anticoagulante), poiché aumenta il rischio di sanguinamento.

