



Il magnesio contribuisce al mantenimento delle ossa in condizioni normali e al mantenimento della normale funzione muscolare.

DESCRIPCIÓN

A cosa serve Agiflex?

Per il mantenimento della cartilagine.

Aiuta a lubrificare le articolazioni e mantiene le articolazioni flessibili.

Quando è indicato assumere Agiflex?

Nei casi di:

- Dolore.
- Rigidità articolare.
- Usura della cartilagine.
- Limitazione del movimento.
- Deformazioni.
- Crepitio.

Ingredienti

Maltodestrina, collagene Peptiplus XP, citrato di magnesio, Chondractiv™ (contenente 55% collagene di tipo II, 12% condroitin solfato e 2% acido ialuronico), aroma di arancia, acido L-ascorbico, correttore di acidità: acido citrico, ialuronato di sodio, condroitin solfato*, edulcorante: sucralosio, Calcio d-pantotenato, piridossina cloridrato, riboflavina, tiamina cloridrato. *Prodotto a base di pesce.

Composizione

Per 1 misurino (10 g): Chondractiv™ 250 mg, collagene 3.000 mg, acido ialuronico 25 mg, condroitin solfato 50 mg, vitamina B1 1,1 mg (100% VRN*), vitamina B2 1,4 mg (100% NRV*), vitamina B6 1,4 mg (100% NRV*), acido pantotenico 6 mg (100% NRV*), vitamina C 80 mg (100% NRV*), magnesio 56,25 mg



Agiflex Barattolo 300 g

EAN: 5605481112331 FABRICANTE: DIETMED



(15% NRV*). *Valor nutritivo de riferimento.

Istruzioni per l'uso

1 misurino (10 g) al giorno, sciolto in mezzo bicchiere d'acqua, tè o succo di frutta.

Controindicazioni

Sconsigliato in caso di gravidanza e allattamento.

L'uso dovrebbe essere evitato negli asmatici.

Il consumo di condroitina dovrebbe essere evitato anche nei pazienti che hanno avuto o stanno avendo una recidiva di cancro alla prostata.

Interazioni farmacologiche e altro

Sono stati descritti effetti avversi minimi per il collagene, principalmente alcuni disturbi gastrointestinali, come sensazione di pienezza, sapore sgradevole e mal di testa. Il solfato di condroitina è sicuro per la maggior parte delle persone. In alcuni casi può causare dolore gastrico e nausea. Sono stati segnalati altri effetti avversi come diarrea, stitichezza, palpebre gonfie, gambe gonfie, perdita di capelli e battito cardiaco irregolare. È necessario prestare attenzione quando si combina la condroitina con il warfarin (anticoagulante), poiché aumenta il rischio di sanguinamento.

