

Glicofort 60 compresse

EAN: 5605481108525 FABRICANTE: DIETMED



GLICOFORT è un integratore alimentare a base di Nopal (Neopuntia®), Mirtillo, Cannella, Quercetina, Magnesio, Zinco, Cromo e Vitamina D.

DESCRIPCIÓN

Quando è indicato assumere Glicofort?

- Nella regolazione della glicemia.
- Modulatore attivo della funzione dell'insulina.
- Per il mantenimento di un sistema cardiovascolare sano.
- Nel diabete.
- Normalizzazione della pressione sanguigna.
- Nella prevenzione dei processi aterosclerotici.

Ingredienti

Ossido di magnesio, *Vaccinium myrtillus* (Mirtillo; estratto concentrato del frutto contenente almeno il 25% di proantocianidine), *Opuntia ficus Indica* (Neopuntia®; estratto secco di Nopal), *Cinnamomum zeylanicum* (Cannella; estratto secco 20:1), agente di carica: microcristallina cellulosa, quercetina, antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, ossido di zinco, antiagglomerante: biossido di silicio, colecalciferolo, cloruro di cromo.

Composizione

Per 2 compresse: Mirtillo (25% proantocianidine) 320 mg, Neopuntia® 200 mg, Cannella 150 mg (equivalenti a 3 g), Quercetina 70 mg, Magnesio 375 mg (100% NRV*), Zinco 10 mg (100% NRV *), Cromo 40 µg (100% NRV*), Vitamina D 5 µg (100% VNR*). *Valore nutritivo di riferimento.

Istruzioni per l'uso

1 compressa 2 volte al giorno, preferibilmente prima dei pasti.

Controindicazioni



Glicofort 60 compresse

EAN: 5605481108525 FABRICANTE: DIETMED



In caso di gravidanza o allattamento è opportuno consultare il medico.

L'uso a lungo termine del cromo può causare irritazione della pelle, mal di testa, vertigini, nausea, sbalzi d'umore e difficoltà di concentrazione, ragionamento e coordinazione. Dosi elevate sono associate a effetti più gravi come disturbi del sangue e danni ai reni o al fegato. Gli individui diabetici devono controllare i valori del glucosio. Il cromo e il magnesio non dovrebbero essere assunti in eccesso da soggetti che hanno problemi ai reni o al fegato. Un eccesso di magnesio può influenzare la frequenza cardiaca, abbassare la pressione sanguigna e causare confusione mentale. Dosi eccessive di zinco possono causare febbre, tosse, dolore gastrico e affaticamento. Lo zinco non deve essere utilizzato nei soggetti affetti da HIV. La vitamina D non deve essere utilizzata nella sarcoidosi e nell'istoplasmosi. I pazienti che devono sottoporsi ad un intervento chirurgico dovrebbero interrompere l'assunzione di mirtillo rosso e cannella almeno 2 settimane prima, a causa dell'influenza sui livelli di glucosio nel sangue durante e dopo l'intervento chirurgico.

Interazioni farmacologiche e altro

Il cromo interagisce con la levotiroxina e l'uso concomitante con i FANS deve essere evitato. Può anche ridurre l'assorbimento di rame e ferro da parte del corpo. L'assunzione insieme di vitamina C ne favorisce l'assorbimento. Dovrebbe essere evitato l'uso concomitante di magnesio con antibiotici, bifosfonati, calcioantagonisti, miorilassanti e diuretici risparmiatori di potassio.

