

Tensicor 60 compresse

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



Integratore alimentare per la pressione alta e per un sano sistema cardiovascolare.

DESCRIPCIÓN

A cosa serve Tensicor?

- Per mantenere una pressione sanguigna sana.
- Modulatore attivo per un flusso sanguigno sano.
- Ipertensione arteriosa.

Ingredienti

Olea europaea (Olivo; estratto di foglie di olivo EFLA 943®), *Crataegus oxyacantha* (Biancospino; estratto concentrato contenente almeno il 18,75% di OPC), *Allium sativum* (Aglione; estratto secco 3:1), Acido L-ascorbico, agente di carica: cellulosa microcristallina, agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, D-alfa-tocoferolo 50%, antiagglomerante: biossido di silicio, selenito di sodio.

Composizione

Per 2 compresse: EFLA 943® Estratto di foglie di olivo 700 mg, Aglio (1% alliina) 500 mg, Biancospino (18,75% OPC) 400 mg, Vitamina C 100 mg (125% NRV*), Vitamina E 12 mg α -TE (100% VRN*), Selenio 55 μ g (100% VRN*). *Valore di riferimento dei nutrienti.

Istruzioni per l'uso

1 compressa 2 volte al giorno, preferibilmente dopo i pasti.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di gravidanza e allattamento.

Un consumo eccessivo di biancospino può causare depressione respiratoria e cardiaca. Non deve essere usato nei primi 3 mesi di gravidanza, né nei bambini sotto i 6 anni di età.

Un consumo eccessivo di aglio può causare irritazioni gastrointestinali, reazioni allergiche e può



Tensicor 60 compresse

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



umentare il rischio di sanguinamento. L'aglio è controindicato in caso di sanguinamento attivo, pre e postoperatorio e nella trombocitopenia. Dovresti evitare di consumare vitamina E e vitamina C in caso di angioplastica. Un consumo eccessivo di vitamina E può causare sanguinamento. Un consumo eccessivo di selenio può causare sintomi come perdita di capelli, striature bianche sulle unghie, affaticamento, irritabilità e sapore metallico.

Interazioni farmacologiche e altro

A causa della presenza di Biancospino, non deve essere associato a eterosidi cardiotonici, beta-bloccanti, agenti ipotensivi o benzodiazepine. Per la presenza dell'aglio non va associato ad anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici, contraccettivi orali e farmaci metabolizzati attraverso il fegato. La vitamina E interagisce con i farmaci metabolizzati dal fegato. Il selenio può interagire con farmaci ipotensivi, sedativi e warfarin.

