

NATURLIDER MAGNESIO CARBONATO 120 COMPRESSE

EAN: 8435110851778 FABRICANTE: NATURLIDER



Naturlider Carbonato di Magnesio in compresse ripristina l'equilibrio elettrolitico nel nostro corpo, ha anche un effetto lassativo perché facilita l'evacuazione intestinale. Grazie al suo contenuto di magnesio, aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento.

DESCRIPCIÓN

Cos'è il Carbonato di Magnesio Naturlider e a cosa serve?

Naturlider Carbonato di magnesio in compresse È un integratore alimentare ad alto contenuto di magnesio, che aiuta a ridurre **la stanchezza e l'affaticamento** .

D'altra parte, il carbonato di magnesio Naturlider contribuisce:

- Per l'equilibrio elettrolitico.
- Al normale metabolismo energetico.
- Al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Al normale funzionamento dei muscoli.
- Alla normale sintesi proteica.
- Alla normale funzione psicologica.
- Al mantenimento delle ossa in condizioni normali.
- Al mantenimento dei denti in condizioni normali.
- Il processo di divisione cellulare.
- Per ridurre la stanchezza e l'affaticamento.

Quali sono le indicazioni per Naturlider carbonato di magnesio?

Naturlider Magnesio Carbonato è indicato per:

- Stitichezza: miglioramento del transito intestinale.
- Bruciore di stomaco.
- Stati di carenza di magnesio (vecchiaia, ansia, crampi, tic, contratture).
- Aiuta in stanchezza e affaticamento.
- Mantenere in buone condizioni e riparare l'usura della cartilagine, dei tendini e delle ossa.



NATURLIDER MAGNESIO CARBONATO 120 COMPRESSE

EAN: 8435110851778 FABRICANTE: NATURLIDER



Il carbonato di magnesio Naturlider ha interazioni, effetti collaterali o controindicazioni?

Consulta un professionista in caso di gravidanza o allattamento, se stai assumendo farmaci o hai condizioni mediche particolari.

Il carbonato di magnesio Naturlider può interagire con qualsiasi farmaco?

Gli integratori di magnesio possono interagire o interferire con alcuni farmaci. Per esempio:

- I bifosfonati, usati per trattare l'osteoporosi, non sono ben assorbiti se assunti senza un tempo sufficiente (prima o dopo) l'assunzione di integratori alimentari o farmaci con elevate quantità di magnesio.
- Gli antibiotici potrebbero non essere assorbiti se assunti senza un tempo sufficiente (prima o dopo) l'assunzione di un integratore alimentare di magnesio.
- I diuretici possono aumentare o diminuire la perdita di magnesio attraverso l'urina, a seconda del tipo di diuretico.
- I medicinali prescritti per alleviare i sintomi del reflusso acido o per trattare l'ulcera peptica possono causare bassi livelli di magnesio nel sangue se assunti per lungo tempo.
- Dosi molto elevate di integratori di zinco possono interferire con la capacità del corpo di assorbire e regolare il magnesio.

