

Nodacil Gel 15 ml x 10 Buste

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Sollievo rapido ed efficace dei sintomi legati all'acidità gastrica.

DESCRIPCIÓN

Cos'è Nodacil?

È un integratore alimentare a base di Magnesio con edulcoranti.

A cosa serve Nodacil?

Nodacil Gel contiene magnesio che contribuisce all'equilibrio elettrolitico, quindi è utile per l'acidità gastrica.

Come prendere Nodacil?

Assumere una bustina 30-60 minuti dopo i pasti principali.

Dose giornaliera consigliata: 1-2 bustine.

Agitare prima dell'apertura.

Vantaggi dell'assunzione di Nodacil

La sensazione di bruciore di stomaco dopo i pasti è causata dal reflusso del contenuto gastrico, che è acido, nell'esofago (organo non predisposto a contenere acidi).

Ciò si verifica a causa di un guasto nel meccanismo di barriera che separa l'esofago dallo stomaco. I fattori che favoriscono il cattivo funzionamento dello sfintere esofageo inferiore sono numerosi e vari, come ad esempio sdraiarsi dopo aver mangiato, obesità, tabacco e alcol, pasti abbondanti, stress, indossare indumenti stretti in vita, alcuni farmaci, alcune malattie come lo iatale ernia e alcuni alimenti come caffè, tè, cola, bevande gassate, cioccolato, menta, agrumi, aglio, pepe...

Nodacil Gel è il tuo sollievo rapido ed efficace dai sintomi legati all'acidità gastrica.

Da cosa è composto Nodacil?

Nodacil Gel contiene sali di magnesio (carbonato di magnesio e trisilicato di magnesio), sali di calcio (carbonato di calcio), alginato di sodio, pectine, gomma di xantano e olio essenziale di menta piperita.

Ingredienti



Nodacil Gel 15 ml x 10 Buste

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Acqua, Agente di carica (trisilicato di magnesio), Carbonato di magnesio, Correttore di acidità (carbonato di calcio), Amido di mais modificato, Agenti gelificanti (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa, pectina, gomma xanthan, alginato di sodio), Olio essenziale di menta piperita, Edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), conservanti (benzoato di sodio, sorbato di potassio).

Principi attivi

Per 1 bustina:

Magnesio: 125 mg (33% NRV*).

Per 2 buste:

Magnesio: 250 mg (66% NRV*).

*NRV: valori nutritivi di riferimento.

Precauzioni

Non assumere questo integratore alimentare se sei allergico o intollerante a uno qualsiasi dei suoi ingredienti.

Il suo utilizzo è sconsigliato durante la gravidanza e l'allattamento.

Separare l'assunzione di Nodacil Gel dall'assunzione di farmaci, almeno 1 ora.

Assumere il prodotto con abbondante acqua per garantire che la sostanza raggiunga lo stomaco.

Avvertenza di pericolo di soffocamento per persone con problemi di deglutizione. Evitare il consumo insieme a farmaci e altri integratori alimentari a base di fibre.

