

## NPro Motilintest 60 capsule

EAN: 8436532901881 FABRICANTE: NPRO



NPro MOTILintest è un procinetico con attività in caso di stitichezza dovuta ad elevata motilità intestinale e che stimola l'evacuazione di microrganismi e tossine in conseguenza di proliferazioni batteriche e/o fungine.

### DESCRIPCIÓN

#### Cos'è NPro Motilintest?

**NPRO Motilintest** migliora la funzionalità del Sistema Motorio Migratorio (MMS), stimolando i neurotrasmettitori coinvolti nel Sistema Nervoso Enterico (ENS) e nel Sistema Nervoso Centrale (SNC), nonché il suo mediatore, il Sistema Nervoso Autonomo (ANS). Completano la formulazione i ceppi probiotici *Bifidobacterium bifidus* CCFM1167 e *Bacillus coagulans* NJ23, il composto procinetico Prodigest®, bisglicinato di magnesio, vitamina B6 e gli induttori della bile: boldo e finocchio.

#### A cosa serve NPro Motilintest?

Utile nella stitichezza cronica dovuta a ridotta motilità intestinale, sindrome dell'intestino irritabile (IBS E) e proliferazioni batteriche (dove la bassa attività del sistema motorio migratorio rende difficile l'espulsione degli elementi patogeni dal tratto intestinale, che può portare a distensione addominale, gas, flatulenza, diarrea, nonché disbiosi cronica o iperpermeabilità intestinale). Colagogo e stimolante coleretico della funzione biliare. Riduce la nausea e la risposta del centro del vomito grazie alla sua attività antiemetica.

#### Qual è la composizione di NPro Motilintest?

COMPOSIZIONE: per 2 capsule

- N-Acetil L-Carnitina 240 mg.
- Griffonia ES (20% 5-HTP) 200 mg.
- Prodigest® 175mg.
- Bisglicinato di magnesio 282 mg.
- *Bifidobacterium bifidus* CCFM1167 6 x 10<sup>7</sup> CFU.
- *Bacillus coagulans* NJ23 4 x 10<sup>7</sup> CFU.
- Zenzero ES (5% gingeroli) 400 mg.
- Boldo ES (0,05% boldina) 60 mg.
- Finocchio ES 5:1 (1% olio essenziale) 30 mg.



## NPro Motilintest 60 capsule

EAN: 8436532901881    FABRICANTE: NPRO



- Vitamina B6 (pirodossale 5 fosfato) 15 mg.

### Qual è la dose giornaliera raccomandata di NPro Motilintest?

Da 1 a 2 capsule al giorno. Assumere 2 ore prima o dopo qualsiasi assunzione.

