

BERBERIN 60 PFLANZLICHE KAPSELN

EAN: 8435110851716 FABRICANTE: NATURLIDER



Naturlider Berberin ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und des Cholesterinspiegels sowie zur Behandlung von Durchfall eingesetzt wird. Von Professional Naturlider.

DESCRIPCIÓN

Was ist Berberin von Naturlider und wofür wird es verwendet?

Berberin von Naturlider wird als natürliches Arzneimittel zur Senkung der Triglyceride, des gesamten zirkulierenden **Cholesterins** und des LDL-Cholesterins eingesetzt.

Das Berberin von Naturlider ist in der Lage, den Glukose- und glykosylierten Hämoglobinspiegel (auch glykosyliert oder glykiert) zu senken: ein biochemischer Parameter, der bei der Behandlung und Kontrolle der Entwicklung von **Diabetes** hilft.

Berberin übt eine gefäßerweiternde Wirkung aus, die eine Senkung des **Blutdrucks** bewirkt, weshalb Berberin auch eine blutdrucksenkende Wirkung zugeschrieben wird.

Was sind die Berberin-Inhaltsstoffe in Naturlider?

Die Inhaltsstoffe von Berberin von Naturlider pro drei Kapseln sind:

- Berberitzen-Trockenextrakt (Berberis vulgaris, Wurzel, 97 % Berberin) 1500 mg.
- Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose*),
- Füllstoff (Kartoffelstärke)
- Gereinigtes Wasser*
- Geliermittel (Gellan Gum*)
- Chrompicolinat 150 µg.
- Chrom 18,75 µg 46,87 %

Formel, die Berberitzenextrakt enthält, der 97 % Berberin und Chrom enthält, ausgewählte Inhaltsstoffe

synergetisch maximale Wirksamkeit erzielen.

Es enthält Kartoffelstärke als Füllstoff, eine Substanz, die in vielen Lebensmitteln wie Reis usw. vorkommt

Getreide, obwohl wir es fast immer mit Kartoffeln assoziieren. Wissenschaftlich gesehen handelt es sich um ein pflanzliches Polysaccharid, das von Menschen aufgenommen werden kann im menschlichen Körper, was es zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Ernährung macht.



BERBERIN 60 PFLANZLICHE KAPSELN

EAN: 8435110851716 FABRICANTE: NATURLIDER



Darüber hinaus präsentiert es die

Folgende Vorteile im Vergleich zu anderen Hilfsstoffen:

- Bessere Ernährung: Wenn wir über die Kartoffel als nahrhaftes Lebensmittel sprechen, heben wir ihren Beitrag in Form hervor aus Kohlenhydraten, also Stärke, liefert unter anderem Kalium, Magnesium, Vitamin A und antioxidative Verbindungen.
 - Stimuliert das Immunsystem.
 - Abführende Wirkung: Stärke führt aufgrund des Bakterienwachstums zu einer Zunahme der Stuhlmasse, was zu einer wohltuenden Wirkung, die Ihnen hilft, besser auf die Toilette zu gehen.
 - Gute Aufnahme von Glukose im Darm: Wir finden unter anderem Vorteile der in Kartoffeln enthaltenen Stärke die effiziente Aufnahme von Glukose in unserem Darm.
- Formel in pflanzlichen Kapseln.
Glutenfrei und laktosefrei

Hat Berberin von Naturlider Wechselwirkungen, Nebenwirkungen oder Kontraindikationen?

Konsultieren Sie den Fachmann im Falle einer Schwangerschaft oder Stillzeit, wenn Sie mit Medikamenten behandelt werden oder unter bestimmten Erkrankungen leiden.
Spezialärzte.

Kontraindiziert in Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern. Verstopfung der Gallenwege.

Es wurden keine toxischen Phänomene im Zusammenhang mit Berberitze beschrieben. Die meisten Autoren sind sich jedoch darin einig, dass bei der Anwendung aufgrund der potenziellen Toxizität aufgrund des Vorhandenseins von Alkaloiden Vorsicht geboten ist. Die Toxizität von Berberin als gereinigtem Alkaloid ist gut belegt: In Dosen bis zu 0,5 g wird es gut vertragen.

Die versehentliche Einnahme von mehr als 0,5 g Berberin äußert sich in Übelkeit, Durchfall, Nasenbluten und hämorrhagischer Nephritis.

In einer klinischen Studie (Yin et al.) zeigten 34,5 % der Patienten mit Typ-2-Diabetes, die 13 Wochen lang mit Berberin (500 mg dreimal täglich) behandelt wurden, vorübergehende gastrointestinale Nebenwirkungen, Durchfall, Verstopfung, Blähungen und Bauchbeschwerden. Es wurden jedoch keine signifikanten Veränderungen der Leberenzyme und des Kreatinins beobachtet.

Bei Empfängern von Nieren- und Herztransplantaten wurde beobachtet, dass Berberin die Konzentration von Ciclosporin um 25 % erhöht.

In einer Studie konnte durch die gleichzeitige Gabe die Ciclosporin-Dosis um 25 bis 100 mg/Tag reduziert werden.

