

Nodacil Gel 15 ml x 10 Umschläge

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Schnelle und wirksame Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit Magensäure.

DESCRIPCIÓN

Was ist Nodacil?

Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Magnesiumbasis mit Süßungsmitteln.

Wofür ist Nodacil?

Nodacil Gel enthält Magnesium, das zum Elektrolytgleichgewicht beiträgt und daher bei Magensäure nützlich ist.

Wie ist Nodacil einzunehmen?

Nehmen Sie einen Beutel 30-60 Minuten nach den Hauptmahlzeiten ein.
Empfohlene Tagesdosis: 1-2 Beutel.
Vor dem Öffnen schütteln.

Vorteile der Einnahme von Nodacil

Das Sodbrennen nach dem Essen wird durch den Rückfluss von saurem Mageninhalt in die Speiseröhre (ein Organ, das nicht auf die Aufnahme von Säuren vorbereitet ist) verursacht. Dies geschieht aufgrund eines Versagens des Barrieremechanismus, der die Speiseröhre vom Magen trennt. Die Faktoren, die eine schlechte Funktion des unteren Ösophagusphinkters begünstigen, sind zahlreich und vielfältig, wie zum Beispiel das Hinlegen nach dem Essen, Fettleibigkeit, Tabak und Alkohol, große Mahlzeiten, Stress, das Tragen enger Kleidung in der Taille, einige Medikamente, bestimmte Krankheiten wie Hiatus Hernie und einige Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Cola, kohlenstoffhaltige Getränke, Schokolade, Minze, Zitrusfrüchte, Knoblauch, Pfeffer ...
Nodacil Gel ist Ihre schnelle und wirksame Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit Magensäure.

Woraus besteht Nodacil?

Nodacil Gel enthält Magnesiumsalze (Magnesiumcarbonat und Magnesiumtrisilikat), Calciumsalze (Calciumcarbonat), Natriumalginat, Pektine, Xanthangummi und ätherisches Pfefferminzöl.



Nodacil Gel 15 ml x 10 Umschläge

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Zutaten

Wasser, Füllstoff (Magnesiumtrisilikat), Magnesiumcarbonat, Säureregulator (Kalziumcarbonat), modifizierte Maisstärke, Geliermittel (mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylcellulose, Pektin, Xanthangummi, Natriumalginat), ätherisches Pfefferminzöl, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Konservierungsmittel (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat).

Wirkstoffe

Für 1 Beutel:

Magnesium: 125 mg (33 % NRV*).

Für 2 Umschläge:

Magnesium: 250 mg (66 % NRV*).

*NRV: Nährstoffreferenzwerte.

Vorsichtsmaßnahmen

Nehmen Sie dieses Nahrungsergänzungsmittel nicht ein, wenn Sie gegen einen seiner Inhaltsstoffe allergisch oder unverträglich sind.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Trennen Sie die Einnahme von Nodacil Gel von der Einnahme von Medikamenten, mindestens 1 Stunde.

Nehmen Sie das Produkt mit reichlich Wasser ein, um sicherzustellen, dass die Substanz in den Magen gelangt. Warnung vor Erstickungsgefahr für Menschen mit Schluckbeschwerden. Vermeiden Sie den Verzehr zusammen mit Medikamenten und anderen ballaststoffhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln.

