

Agiflex 20 Ampolles

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



AGIFLEX és un complement alimentari a base de Chondractiv™ (conté 55% de col·lagen Tipus II, 12% Sulfat de Condroitina i 2% d'Àcid Hialurònic), és a dir, una combinació patentada d'elements que tenen una marcada acció condrotector.

DESCRIPCIÓ

Per què serveix Agiflex?

Per al manteniment del cartílag.

Ajuda a lubricar les articulacions i manté les articulacions flexibles.

Quan està indicat prendre Agiflex?

En els casos de:

- Dolor.
- Rigidesa articular.
- Desgast del cartílag.
- Limitació del moviment.
- Deformacions.
- Crepitacions.

Ingredients

Aigua, fructosa, concentrat de raïm, col·lagen marí hidrolitzat*, sulfat de condroitina*, Chondractiv™ (contenint 55% de Col·lagen Tipus II, 12% de Sulfat de Condroitina i 2% d'Àcid Hialurònic), àcid L-ascòrbic hialuronat de sodi, aroma de taronja, regulador d'acidesa: àcid cítric, conservant: sorbat de potassi, naringina. *Producte a base de peix.

Composició Per 1 botella:

- Chondractiv™ 250 mg (contenint 55% de Col·lagen Tipus II, 12% de Sulfat de Condroitina i 2% d'Àcid Hialurònic).



Agiflex 20 Ampolles

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



- Col·lagen total 900 mg.
- Sulfat de Condroitina total 300 mg.
- Àcid hialurònic total 45 mg.
- Vitamina C 120 mg (150% VRN*).
- Bioflavonoides 100 mg.
- Naringina 10 mg.

*Valor de Referència de Nutrients.

Sabor a taronja.

Utilització

1 ampolla al dia, preferentment abans de l'esmorzar. Pot ser dissolta amb aigua o en suc de fruites.

Contraindicacions

No recomanat en cas d'embaràs i lactància.

Cal evitar lús en els asmàtics.

També cal evitar el consum de condroitina en pacients que han tingut o que tenen una recurrència de càncer de pròstata.

Interaccions Medicamentoses i altres

Estan descrits efectes adversos mínims per al col·lagen, principalment certa incomoditat gastrointestinal, com a sensació de sacietat i de sabor desagradable, i mal de cap. El sulfat de condroitina és segur per a la majoria de les persones. En alguns casos pot causar dolor gàstric i nàusees. S'han registrat altres efectes adversos com diarrea, restrenyiment, parpelles inflades, cames inflades, pèrdua de cabell i batec cardíac irregular. Cal anar amb compte en associar la condroitina a la warfarina (anticoagulant), perquè augmenta el risc d'hemorràgia.

