

Agiflex 40 Càpsules

EAN: 5605481107306 FABRICANTE: DIETMED



La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per al funcionament normal dels cartíl·lags.

DESCRIPCIÓ

Per què serveix Agiflex?

Per al manteniment del cartílag.

Ajuda a lubricar les articulacions i manté les articulacions flexibles.

Quan està indicat prendre Agiflex?

En els casos de:

- Dolor.
- Rigidesa articular.
- Desgast del cartílag.
- Limitació del moviment.
- Deformacions.
- Crepitacions.

Ingredients

Chondractiv™ (contenint 55% de Col·lagen Tipus II, 12% de Sulfat de Condroitina i 2% d'Àcid Hialurònic), agent de càrrega: cel·lulosa microcristalina, col·lagen marí*, gelatina, àcid L-ascòrbic, quercetina, hialuron de condroitina*, naringina, antiaglomerants: sals magnèsiques d'àcids grassos, diòxid de silici.

Composició

Per 2 càpsules: Chondractiv™ 500 mg, Col·lagen 500 mg, Àcid Hialurònic 50 mg, Sulfat de Condroitina 100 mg, Vitamina C 80 mg (100% VRN*), Quercetina 60 mg, Naringina 20 mg. *Valor de Referència de Nutrients.

Utilització



Agiflex 40 Càpsules

EAN: 5605481107306 FABRICANTE: DIETMED



1 càpsula 2 cops al dia, preferentment abans de l'esmorzar i abans del sopar.

Contraindicacions

No recomanat en cas d'embaràs i lactància.

Cal evitar lús en els asmàtics. També cal evitar el consum de condroitina en pacients que han tingut o que tenen una recurrència de càncer de pròstata.

Interaccions Medicamentoses i altres

Estan descrits efectes adversos mínims per al col·lagen, principalment certa incomoditat gastrointestinal, com a sensació de sacietat i de sabor desagradable, i mal de cap. El sulfat de condroitina és segur per a la majoria de les persones. En alguns casos pot causar dolor gàstric i nàusees. S'han registrat altres efectes adversos com diarrea, restrenyiment, parpelles inflades, cames inflades, pèrdua de cabell i batec cardíac irregular. Cal anar amb compte en associar la condroitina a la warfarina (anticoagulant), perquè augmenta el risc d'hemorràgia.

