

Tensicor 60 Comprimits

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



Complement alimentari per a la hipertensió arterial i per a un sistema cardiovascular saludable.

DESCRIPCIÓ

Per què està indicat Tensicor?

- Per mantenir una pressió arterial saludable.
- Modulador actiu per a un flux sanguini saludable.
- Hipertensió arterial.

Ingredients

Olea europaea (Olivo; extracte de fulles d'Olivera EFLA 943®), *Crataegus oxyacantha* (Espí blanc; extracte concentrat contenint almenys 18,75% d'OPC), *Allium sativum* (All; extracte sec 3:1), àcid L-ascòrbic, agent de càrrega: cel·lulosa microcristal·lina, antiaglomerant: sals magnèsiques d'àcids grassos, D-alfatocoferol 50%, antiaglomerant: diòxid de silici, selenit de sodi.

Composició

Per 2 comprimits: Extracte de Fulles d'Olivera EFLA 943® 700 mg, All (1% d'aliina) 500 mg, Espí blanc (18,75% OPC) 400 mg, Vitamina C 100 mg (125% VRN*), Vitamina E 12 mg α -TE (100% VRN*), Seleni 55 μ g (100% VRN*). *Valor de Referència de Nutrients.

Utilització

1 comprimit 2 cops al dia, preferentment després dels àpats.

Contraindicacions

No fer servir en cas d'embaràs i lactància.

El consum excessiu d'Espino Blanco pot produir depressió respiratòria i cardíaca. No s'ha de fer servir en els primers 3 mesos d'embaràs, ni en nens menors de 6 anys.

El consum excessiu d'all pot causar irritacions gastrointestinals, reaccions al·lèrgiques i pot augmentar el



Tensicor 60 Comprimits

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



risc d'hemorràgies. L'all està contraindicat en cas d'hemorràgies actives, pre i post operatori i en la trombocitopènia. Cal evitar consumir vitamina E i vitamina C en cas d'angioplàstia. El consum excessiu de vitamina E pot provocar hemorràgia. El consum excessiu de seleni pot causar símptomes com la pèrdua de cabell, ratlles blanques a les ungles, fatiga, irritabilitat i sabor metàl·lic.

Interaccions Medicamentoses i altres

A causa de la presència d'Espino Blanco, no s'ha d'associar amb heteròsids cardiotònics, betabloquejants, hipotensors, ni amb benzodiazepines. A causa de la presència d'all no cal associar-los amb anticoagulants, antiagregants plaquetaris, contraceptius orals i fàrmacs metabolitzats per via hepàtica. La vitamina E interactua amb medicaments metabolitzats pel fetge. El seleni pot interactuar amb medicaments hipotensors, amb sedatius i amb la warfarina.

