

Iode 50 Càpsules

EAN: 8437009283448

FABRICANTE: ERGOSPHERE



Oligoelements. Iode microgrànuls. Envàs de 50 càpsules de microgrànuls Ergosphere

DESCRIPCIÓ

Ingredients: Iodur potàssic (I 40mcg)

Utilització:

No superar la dosi expressament recomanada. Mantenir en un lloc fresc i sec i lluny de l'abast dels nens més petits.

Els complements nutricionals no substitueixen una dieta equilibrada ni un estil de vida sa.

Prendre 1 o 2 càpsules al dia o segons la recomanació del professional de la salut.

Propietats:

Indicat en trastorns funcionals de la glàndula tiroide i de la tensió arterial.

L'I juntament amb l'aminoàcid tirosina intervé en la formació de l'hormona tiroxina (T4, T3).

La carència de I pot no ser de causa QUANTITATIVA sinó en BIODISPONIBILITAT (substàncies antitiroïdals en llegums, cols, naps, soja, cacauets, pinyons, mill...) o deficiència cofactors en conversió de T4 a T3 (Zn, Cu, Se, I) . Importància de l'I catalític.


Causas hipotiroïdisme: Manifest o Primari (deficiència I en dieta. Goll. Detectable analítica). Subclínic o Secundari (Síndrome Wilson. Origen hipofisiari. Detectable analítica). Hipotiroïdisme Funcional (analítica correcta però Prova de Barnes positiu), és hipot. Cel·lular, alteració de T4 a T3, incidència del 25%.

Causas Hipertiroïdisme: 85% malaltia de Greus (autoimmune).

Intervé en l'activació del sistema immune (leucòcits polimorfonuclears) i té un efecte bactericida.

L'I en dosis catalítiques no sol donar reaccions d'intolerància (iodisme), fins i tot en persones al·lèrgiques a





I¹.

Disfunció tiroïdal lleu Hipertiroïdisme: Mn , I, Zn, Se. S'aconsella cura de 1 mes de cada dos.

Hipotiroïdisme: Mn+Cu, I, Zn, Se. S'aconsella cura de 1 mes de cada dos.

Les necessitats disminueixen amb l'edat i augmenten amb creixement i embaràs.

La deficiència de I no es limita exclusivament a països en vies de desenvolupament. El 1990 només uns quants països era iodosuficients. LA deficiència de I té importants conseqüències per al desenvolupament embrionari i postnatal. De fet, la deficiència de I és la causa més comuna de retard mental evitable, ja que els sòls de la majoria del món són pobres a I.

El fetus és molt sensible a deficiència de I, el suplement de I al començament del 2n trimestre de l'embaràs podria evitar la major part del dany al fetus.

El iode catalític és equilibrador de la funció tiroïdal per la qual cosa és possible utilitzar-lo tant en hipertiroïdisme com hipotiroïdisme, normalment associat al seu o als seus oligoelements del terreny.

El I catalític eficaç en: DISTIROIDISMES, DISMENORREES (hiper i singlot), obesitat tiroïdal, Hipertensió arterial.

Associar I (dies alterns) amb Mn (tots els dies) en hipertensió arterial quan és estable.

Associar I (dies alterns) amb Mn -Co (tots els dies) en HA quan és inestable.

Relació d'incidència de la malaltia fibroquística mamària amb hipotiroïdisme funcional (l'epiteli té més sensibilitat davant l'estimulació per estrògens).

