


CANDISYN 30 CÀPSULES VEGETALS

EAN: 8435110851747 **FABRICANTE:** NATURLIDER



Candisyn de Naturlider és un complement alimentari que de manera natural ens ajuda a combatre la candidiasi, cànrida o fongs vaginals.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Candisyn de Naturlider?

Candisyn de Naturlider conté extractes de plantes, triglicèrids de cadena mitjana, ferments làctics com *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus acidophilus* que contribueixen a restablir la flora vaginal en el cas de candidiasi o cànrida, o com a preventiu si es prenen antibiòtics. Candisyn Naturlider és un excel·lent probiòtic en el cas de fongs vaginals.

Quins són els ingredients de Candisyn de Naturlider?

Els ingredients de Candisyn de Naturlider, per tres càpsules són:

MCT Cadena mitjana de triglicèrids (Triglicèrids de cadena mitjana de l'oli de palmiste, xarop de glucosa, caseïnat (llet), fosfat de dipotassi, fosfat tricàlcic) 799,98 mg, VGA-1 (gluten i soja) (*Lactobacillus rhamnosus* +) ($\geq 100 \times 10^9$ ufc/g) 300 mg, agent de recobriment (Hidroxiopropilmetilcel·lulosa*), extracte sec de Pau d'Arc (*Tabebuia avellanedae*, escorça, ràtio 4:1) 300 mg, extracte sec d'Orenga (*Origanum vulgare*, herba, ràtio 5:1) 300 mg, extracte sec de Clau (*Eugenia caryophyllata*, flor, ràtio 10:1) 150 mg, agent de càrrega (Cel·lulosa microcristal·lina), antiaglomerant (Estearat de magnesi), aigua purificada*, agent de càrrega (Calci Fosfat Dihidrat) i gelificant (Goma Gellán*).

*Components de la càpsula.

Quins beneficis té prendre Candisyn de Naturlider?

Candisyn de Naturlider està recomanat per a infeccions per llevats (Candidiasi).

Ajuda a restablir l'equilibri de la flora contra la presència de cànrides i altres micosis de l'intestí, de la pell o polisistèmiques.

Els components de Candisyn tenen poder antifúngic, antibiòtic, analgèsic, antioxidant, cicatritzant, antiinflamatori tant de les mucoses com dels músculs, immunoestimulants i restauradors de les mucoses.

Quines són les característiques de candisy de Naturlider?

Les característiques de Candisyn de Naturlider són:

És una combinació d'ingredients naturals que han estat estudiats i reconeguts per la seva eficàcia en el



CANDISYN 30 CÀPSULES VEGETALS

EAN: 8435110851747 **FABRICANTE:** NATURLIDER



tractament de la candidiasi.

Els ingredients de la fórmula tenen un efecte antifúngic, antibiòtic, antioxidant i enfortidor del sistema immunitari, efectes necessaris per combatre la candidiasi.

Té efectes secundaris, interaccions o contraindicacions Candisyn de Naturlider?

Consulteu el professional en cas d'embaràs o lactància, si esteu en tractament amb medicació o presenteu unes condicions mèdiques especials.

El consum de MCT és segur, i només si es consumeixen dosis elevades (més grans de 30 grams) poden causar trastorns gastrointestinals. En combinar-los amb hidrats de carboni es redueixen aquests efectes secundaris. Les persones amb diabetis malament. Pel seu contingut a Pau d'arc, és recomanable realitzar tractaments discontinus: fins a 1 mes i descansar 2 setmanes abans d'una nova presa. Els casos de toxicitat sempre s'han relacionat amb la presa de productes a base de compostos aïllats de l'escorça, i no amb la droga. Tenint en compte algunes experiències en rosegadors, no s'ha d'administrar durant l'embaràs per perill d'avortament i teratogenicitat. També es recomana no prescriure'l durant la lactància. Els pacients que es troben en tractament anticoagulant o antiagregant plaquetari s'han d'abstenir d'ingerir aquest producte sense consulta prèvia amb un facultatiu, ja que les naftoquinones poden incrementar aquest efecte. El seu consum simultani amb immunosupressors pot accentuar aquest darrer efecte. D'altra banda, la combinació de compostos sulfurats presents en algunes plantes (per exemple all, herba mat) promouen una base catalítica per a la transformació de lapachol a β -lapachona.

Els pacients que consumeixen lapacho poden tenir una coloració més fosca de l'orina.

Per l'efecte antiagregant plaquetari del Clau podria augmentar el risc de sagnat si es pren concomitantment amb anticoagulants i que pot produir un fals augment en les concentracions de fenitoïna. No obstant això, aquestes interaccions teòriques no interfereixen en el seu ús tradicional com a antisèptic en forma d'esbandidas bucal.

