

Nodacil Gel 15 ml x 10 Sobres

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Alleugeriment ràpid i eficaç dels símptomes relacionats amb l'acidesa gàstrica.

DESCRIPCIÓ

Què és Nodacil?

És un complement alimentari a base de Magnesi amb edulcorants.

Per què serveix Nodacil?

Nodacil Gel conté magnesi que contribueix a l'equilibri electrolític, per tant serveix per a l'acidesa gàstrica.

Com prendre Nodacil?

Agafeu un sobre entre 30-60 minuts després dels principals àpats.

Dosi diària recomanada: 1-2 sobres.

Agiteu abans d'obrir.

Beneficis de prendre Nodacil

La sensació d'acidesa després dels àpats la produeix el reflux del contingut gàstric, que és àcid, a l'esòfag (un òrgan no preparat per contenir àcids).

Això passa per una fallada en el mecanisme de barrera que separa l'esòfag de l'estómac. Els factors que afavoreixen el mal funcionament de l'esfínter esofàgic inferior són nombrosos i variats com estirar-se després d'haver menjat, l'obesitat, el tabac i l'alcohol, els àpats abundants, l'estrès, portar roba ajustada a la cintura, alguns fàrmacs, certes malalties com l'hèrnia de hiatal i alguns aliments com el cafè, te, refrescos de cua, begudes amb gas, xocolata, menta, cítrics, all, pebrot...

Nodacil Gel és el teu alleugeriment ràpid i eficaç dels símptomes relacionats amb l'acidesa gàstrica.

De què es compon Nodacil?

Nodacil Gel conté sals de magnesi (Carbonat de magnesi i trisilicat de magnesi) sals de calci (carbonat càlcic), Alginat sòdic, pectines, goma xantana i Oli essencial de menta.

Ingredients



Nodacil Gel 15 ml x 10 Sobres

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Aigua, Agent de càrrega (trisilicat magnèsic), Carbonat de magnesi, Corrector d'acidesa (carbonat càlcic), Midó modificat de blat de moro, Gelificants (cel·lulosa microcristal·lina, carboximetilcel·lulosa, pectina, goma xantana, alginat sòdic), Oli essencial acesulfame K, sucralosa), Conservadors (benzoat sòdic, sorbat potàssic).

Ingredients Actius

Per 1 sobre:

Magnesi: 125 mg (33% VRN*).

Per 2 sobres:

Magnesi: 250 mg (66% VRN*).

*VRN: Valors de Referència de Nutrients.

Precaucions

No prengueu aquest complement alimentari si és al·lèrgic o intolerant a algun dels seus ingredients.

No se'n recomana l'ús durant l'embaràs i la lactància.

Separau la presa de Nodacil Gel de la presa de medicaments, almenys 1 hora.

Prendre el producte amb molta aigua per assegurar-se que la substància arriba a l'estómac. S'adverteix de perill d'asfíxia per a persones amb problemes de deglució. Evitar el consum juntament amb medicaments i altres complements alimentaris a base de fibra.

