

Colnatur Forte 30 Comp

EAN: 8426594107635 FABRICANTE: ORDESA



Complement alimentari a base de col·lagen nadiu tipus II, extracte de salze, extracte d'harpagofit, àcid hialurònic i vitamina C.

DESCRIPCIÓ

Indicacions

Especialment indicat per a la cura intensiva d'articulacions*.

* **Colnatur® FORTE** ajuda a:

- **CARTÍLAGS:** La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per al funcionament normal dels cartílags.
- **OSSOS:** La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per al funcionament normal dels ossos.

Colnatur® Forte es presenta en forma de comprimit bicapa amb doble acció:

- **Primera capa:** Composta de col·lagen nadiu tipus II, àcid hialurònic i vitamina C, té cura de les articulacions*.
- **Segona capa:** Composta d'extracte de salze ¹ i extracte d'harpagofit ², tradicionalment utilitzats per reduir el dolor articular.

Consulteu el vostre metge o farmacèutic si feu ús d'anticoagulants orals o si teniu al·lèrgia als salicilats.

Composició

Capa superior: agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina), hialuronat sòdic (àcid hialurònic), col·lagen natiu tipus II, àcid L-ascòrbic (vitamina C), estabilitzant (hidrogenofosfat de calci), estabilitzant (polivinilpirrolidona), anti-silici, estabilitzant (estearat de magnesi), estabilitzant (talc).

Capa inferior: extracte sec de salze (*Salix alba L.*, escorça) amb 30% de salicina, extracte sec



Colnatur Forte 30 Comp

EAN: 8426594107635 FABRICANTE: ORDESA



d'harpagòfit (*Harpagophytum procumbens* DC., arrel) amb 2% harpagòsids, agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina), estabilitzant (, estabilitzant (hidrogenofosfat de calci), estabilitzant (estearat de magnesi), antiaglomerant (diòxid de silici).

Recobriments: agent de recobriments (hidroxipropilmetilcel·lulosa), agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina), estabilitzant (àcid esteàric).

Sense greixos, sucres, colorants artificials ni gluten.

Comprimits bicapa.

Utilització

Prendre 1 comprimit al dia amb aigua, fora dels àpats (mitja hora abans o almenys 2 hores després de prendre aliments).

