

bio-farma

Agiflex 20 Ampolas

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



AGIFLEX é um suplemento alimentar à base de Chondractiv™ (contém 55% de colágeno Tipo II, 12% de Sulfato de Condroitina e 2% de Ácido Hialurônico), ou seja, uma combinação patenteada de elementos que possuem acentuada ação condroprotetora.

DESCRIPCIÓN

Para que serve o Agiflex?

Para a manutenção da cartilagem.

Ajuda a lubrificar as articulações e mantém as articulações flexíveis.

Quando é indicado tomar Agiflex?

Nos casos de:

- Dor.
- Rigidez articular.
- Desgaste da cartilagem.
- Limitação de movimento.
- Deformações.
- Estalos.

Ingredientes

Água, frutose, concentrado de uva, colágeno marinho hidrolisado*, sulfato de condroitina*, Chondractiv™ (contendo 55% de colágeno tipo II, 12% de sulfato de condroitina e 2% de ácido hialurônico), ácido L-ascórbico, bioflavonóides, hialuronato de sódio, sabor de laranja, regulador de acidez: ácido cítrico, conservante: sorbato de potássio, naringina. *Produto à base de peixe.


Composição por 1 ampola:

- Chondractiv™ 250 mg (contendo 55% de colágeno tipo II, 12% de sulfato de condroitina e 2% de ácido hialurônico).

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241119
https://bio-farma.es/comprar_pt/f/dietmed/agiflex-20-ampolas

<https://bio-farma.es> - info@bio-farma.es

C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain

 +34 696 79 77 77



Agiflex 20 Ampolas

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



- Colágeno total 900 mg.
- Sulfato de Condroitina Total 300 mg.
- Ácido Hialurónico Total 45 mg.
- Vitamina C 120 mg (150% VRN*).
- Bioflavonóides 100 mg.
- Naringina 10 mg.

*Valor de Referência dos Nutrientes.

Sabor laranja.

Instruções de uso

1 ampola por dia, de preferência antes do pequeno almoço. Pode ser dissolvido em água ou suco de frutas.

Contra-indicações

Não recomendado em caso de gravidez e lactação.

O uso deve ser evitado em asmáticos.

O consumo de condroitina também deve ser evitado em pacientes que tiveram ou estão apresentando recorrência de câncer de próstata.

Interações medicamentosas e outros

Efeitos adversos mínimos foram descritos para o colágeno, principalmente algum desconforto gastrointestinal, como sensação de saciedade e sabor desagradável, e dor de cabeça. O sulfato de condroitina é seguro para a maioria das pessoas. Em alguns casos, pode causar dores gástricas e náuseas. Outros efeitos adversos, como diarreia, prisão de ventre, pálpebras inchadas, pernas inchadas, perda de cabelo e batimentos cardíacos irregulares foram relatados. Deve-se ter cuidado ao combinar condroitina com varfarina (anticoagulante), pois aumenta o risco de sangramento.

