



O magnésio contribui para a manutenção dos ossos em condições normais e para a manutenção da função muscular normal.

DESCRIPCIÓN

Para que serve o Agiflex?

Para a manutenção da cartilagem.

Ajuda a lubrificar as articulações e mantém as articulações flexíveis.

Quando é indicado tomar Agiflex?

Nos casos de:

- Dor.
- Rigidez articular.
- Desgaste da cartilagem.
- Limitação de movimento.
- Deformações.
- Estalos.

Ingredientes

Maltodextrina, colágeno Peptiplus XP, citrato de magnésio, Chondractiv™ (contendo 55% de colágeno tipo II, 12% de sulfato de condroitina e 2% de ácido hialurônico), sabor laranja, ácido L-ascórbico, regulador de acidez: ácido cítrico, hialuronato de sódio, sulfato de condroitina*, adoçante: sucralose, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, riboflavina, cloridrato de tiamina. *Produto à base de peixe.

Composição

Por 1 medida (10 g): Chondractiv™ 250 mg, Colágeno 3000 mg, Ácido Hialurônico 25 mg, Sulfato de condroitina 50 mg, Vitamina B1 1,1 mg (100% VRN*), Vitamina B2 1,4 mg (100% NRV*), Vitamina B6 1,4 mg (100% NRV*), ácido pantotênico 6 mg (100% VRN*), Vitamina C 80 mg (100% VRN*), Magnésio 56,25





mg (15% VRN*).*Valor de referência do nutriente.

Instruções de uso

1 medida (10 g) por dia, dissolvida em meio copo de água, chá ou suco de fruta.

Contra-indicações

Não recomendado em caso de gravidez e lactação.

O uso deve ser evitado em asmáticos.

O consumo de condroitina também deve ser evitado em pacientes que tiveram ou estão apresentando recorrência de câncer de próstata.

Interações medicamentosas e outros

Efeitos adversos mínimos foram descritos para o colágeno, principalmente algum desconforto gastrointestinal, como sensação de saciedade e sabor desagradável, e dor de cabeça. O sulfato de condroitina é seguro para a maioria das pessoas. Em alguns casos, pode causar dores gástricas e náuseas. Outros efeitos adversos, como diarreia, prisão de ventre, pálpebras inchadas, pernas inchadas, perda de cabelo e batimentos cardíacos irregulares foram relatados. Deve-se ter cuidado ao combinar condroitina com varfarina (anticoagulante), pois aumenta o risco de sangramento.

