

Carbonato de Magnésio 120 Comprimidos

EAN: 8435110851778 FABRICANTE: NATURLIDER



Naturlider Carbonato de Magnésio em comprimidos restaura o equilíbrio eletrolítico do nosso corpo, também tem um efeito laxante porque facilita a evacuação intestinal. Devido ao seu teor de magnésio, ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga.

DESCRIPCIÓN

O que é o Carbonato de Magnésio Naturlider e para que serve?

Naturlider Carbonato de Magnésio em comprimidos É um suplemento alimentar com alto teor de magnésio, que ajuda a reduzir **o cansaço e a fadiga** .

Por outro lado, o carbonato de magnésio Naturlider contribui:

- Para o equilíbrio eletrolítico.
- No metabolismo energético normal.
- Para o funcionamento normal do sistema nervoso.
- Para o funcionamento normal dos músculos.
- Para a síntese normal de proteínas.
- Para a função psicológica normal.
- À manutenção dos ossos em condições normais.
- À manutenção dos dentes em condições normais.
- O processo de divisão celular.
- Para reduzir o cansaço e a fadiga.

Quais são as indicações do Carbonato de Magnésio Naturlider?

O Carbonato de Magnésio Naturlider é indicado para:

- Constipação: melhora do trânsito intestinal.
- Acidez estomacal.
- Estados de deficiência de magnésio (velhice, ansiedade, câibras, tiques, contraturas).
- Auxilia no cansaço e fadiga.
- Manter em bom estado e reparar o desgaste das cartilagens, tendões e ossos.



Carbonato de Magnésio 120 Comprimidos

EAN: 8435110851778 FABRICANTE: NATURLIDER



O carbonato de magnésio Naturlider tem interações, efeitos colaterais ou contra-indicações?

Consulte um profissional em caso de gravidez ou lactação, se estiver tomando medicamentos ou tiver condições médicas especiais.

O Carbonato de Magnésio Naturlider pode interagir com algum medicamento?

Os suplementos de magnésio podem interagir ou interferir com alguns medicamentos. Por exemplo:

- Os bisfosfonatos, usados para tratar a osteoporose, não são bem absorvidos quando tomados sem tempo suficiente (antes ou depois) de tomar suplementos dietéticos ou medicamentos com quantidades elevadas de magnésio.
- Os antibióticos podem não ser absorvidos se tomados sem tempo suficiente (antes ou depois) de tomar um suplemento dietético de magnésio.
- Os diuréticos podem aumentar ou diminuir a perda de magnésio pela urina, dependendo do tipo de diurético.
- Medicamentos prescritos para aliviar os sintomas de refluxo ácido ou para tratar úlcera péptica podem causar baixos níveis de magnésio no sangue quando tomados por um longo período de tempo.
- Doses muito altas de suplementos de zinco podem interferir na capacidade do corpo de absorver e regular o magnésio.

