

Nodacil Gel 15 ml x 10 Envelopes

EAN: 8425652550611 **FABRICANTE:** NOVADIET



Alívio rápido e eficaz dos sintomas relacionados com a acidez gástrica.

DESCRIPCIÓN

O que é Nodacil?

É um suplemento alimentar à base de Magnésio com adoçantes.

Para que serve o Nodacil?

Nodacil Gel contém magnésio que contribui para o equilíbrio eletrolítico, portanto é útil para a acidez gástrica.

Como tomar Nodacil?

Tomar uma saqueta entre 30-60 minutos após as refeições principais.

Dose diária recomendada: 1-2 saquetas.

Agite antes de abrir.

Benefícios de tomar Nodacil

A sensação de azia após as refeições é causada pelo refluxo do conteúdo gástrico, que é ácido, para o esôfago (órgão não preparado para conter ácidos).

Isto ocorre devido a uma falha no mecanismo de barreira que separa o esôfago do estômago. Os fatores que promovem o mau funcionamento do esfíncter esofágico inferior são numerosos e variados, como deitar-se após comer, obesidade, tabaco e álcool, refeições fartas, estresse, uso de roupas apertadas na cintura, alguns medicamentos, certas doenças como o hiato. hérnia e alguns alimentos como café, chá, cola, refrigerantes, chocolate, hortelã, frutas cítricas, alho, pimenta...

Nodacil Gel é o seu alívio rápido e eficaz dos sintomas relacionados à acidez gástrica.

Do que é composto o Nodacil?

Nodacil Gel contém sais de magnésio (carbonato de magnésio e trissilicato de magnésio), sais de cálcio (carbonato de cálcio), alginato de sódio, pectinas, goma xantana e óleo essencial de hortelã-pimenta.

Ingredientes



Nodacil Gel 15 ml x 10 Envelopes

EAN: 8425652550611 **FABRICANTE:** NOVADIET



Água, Agente de volume (trissilicato de magnésio), Carbonato de magnésio, Regulador de acidez (carbonato de cálcio), Amido de milho modificado, Agentes gelificantes (celulose microcristalina, carboximetilcelulose, pectina, goma xantana, alginato de sódio), Óleo essencial de hortelã-pimenta, Adoçantes (acesulfame K, sucralose), conservantes (benzoato de sódio, sorbato de potássio).

Ingredientes Ativos

Para 1 saqueta:

Magnésio: 125 mg (33% VRN*).

Para 2 envelopes:

Magnésio: 250 mg (66% VRN*).

*VNR: Valores de Referência dos Nutrientes.

Precauções

Não tome este suplemento alimentar se for alérgico ou intolerante a algum dos seus ingredientes.

Seu uso não é recomendado durante a gravidez e lactação.

Separe a toma de Nodacil Gel da toma de medicamentos, pelo menos 1 hora.

Tomar o produto com bastante água para garantir que a substância chegue ao estômago. Aviso sobre perigo de asfixia para pessoas com problemas de deglutição. Evite o consumo junto com medicamentos e outros suplementos alimentares à base de fibras.

