

Digestivaid No Acid Forte Pocket Drink 16 Envelopes

EAN: 8008843133796 **FABRICANTE:** TREPATDIET



Digestivaid alivia rapidamente o refluxo, azia e azia, bem como outros sintomas associados à digestão lenta ou pesada.

DESCRIPCIÓN

O que é Digestivaid e para que é utilizado?

É um suplemento alimentar à base de extratos vegetais concentrados que é utilizado para aliviar a acidez e azia, dispepsia, refluxo, gastrite. Portanto, é antiácido, digestivo e protetor. Contém flavonóides (alcaçuz e camomila) e polissacarídeos naturais obtidos a partir de Aloe Vera e algas marinhas que criam uma barreira sobre o conteúdo do estômago para prevenir o refluxo e, por sua vez, proteger a mucosa gástrica. tem gosto de alcaçuz.

Em quais casos o Digestivaid é indicado?

- Alivia a acidez e a azia que podem aparecer associadas a refeições abundantes, maus hábitos alimentares (café, álcool, comidas condimentadas...), azia secundária à ingestão de medicamentos (AINEs, antibióticos, ferro), stress, tabaco.
- Trata os sintomas associados à dispepsia ou queixas digestivas inespecíficas (queimação, dor, náusea, inchaço, gases, sensação de peso...)
- protege a mucosa digestiva, em caso de azia, refluxo, gastrite, úlcera ou Helicobacter pylori, e promove a sua reparação, ajudando a restabelecer a saúde digestiva em distúrbios relacionados com a acidez, como gastrite ou úlcera.

Qual é a composição do Digestivaid?

A composição de um envelope é:

- Doce camomila, flores é teta. 0,3% apigenina 200mg
- Funcho, fruta é teta. 0,5% óleo essencial 200mg
- Alcaçuz, extrato fluido 200 mg
- Aloe Vera, é 200:1 30mg

Como usar o Digestivaid?

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241125
https://bio-farma.es/comprar_pt/f/trepatdiet/digestivaid-no-acid-forte-pocket-drink-16-envelopes



Digestivaid No Acid Forte Pocket Drink 16 Envelopes

EAN: 8008843133796 **FABRICANTE:** TREPATDIET



Debe tomar una saqueta após a refeição ou sempre que necessitar.

Recomendações de uso do Digestivaid?

Não é recomendado na gravidez.

Pelo menos uma hora de distância de tomar a medicação.

