



Vitamin C bidrar till normal bildning av kollagen för att brosket ska fungera normalt.

### DESCRIPCIÓN

#### Vad är Agiflex till för?

För underhåll av brosk.

Det hjälper till att smörja lederna och håller lederna flexibla.

#### När är det indicerat att ta Agiflex?

I fall av:

- Smärta.
- Ledstyvhet.
- Broskslitage.
- Begränsning av rörelse.
- Deformationer.
- Knastrar.

### Ingredienser

Chondractiv™ (innehåller 55 % typ II kollagen, 12 % kondroitinsulfat och 2 % hyaluronsyra), bulkmedel: mikrokristallin cellulosa, marint kollagen\*, gelatin, L-askorbinsyra, quercetin, natriumhyaluronat, sulfatkondroitin, anti, naringindroitin\* -karningsmedel: magnesiumsalter av fettsyror, kiseldioxid.

### Sammansättning

För 2 kapslar: Chondractiv™ 500 mg, Kollagen 500 mg, Hyaluronsyra 50 mg, Kondroitinsulfat 100 mg, Vitamin C 80 mg (100 % VRN\*), Quercetin 60 mg, Naringin 20 mg. \*Referensvärde för näringsämnen.

### Bruksanvisning

1 kapsel 2 gånger om dagen, helst före frukost och före middag.





### Kontraindikationer

Rekommenderas inte vid graviditet och amning.

Användning bör undvikas hos astmatiker. Kondroitinkonsumtion bör också undvikas hos patienter som har haft eller har haft ett återfall av prostatacancer.

### Läkemedelsinteraktioner och andra

Minimala negativa effekter har beskrivits för kollagen, främst vissa gastrointestinala obehag, såsom en känsla av mättnad och obehaglig smak, och huvudvärk. Kondroitinsulfat är säkert för de flesta. I vissa fall kan det orsaka magsmärtor och illamående. Andra negativa effekter som diarré, förstoppning, svullna ögonlock, svullna ben, håravfall och oregelbunden hjärtrytm har rapporterats. Försiktighet bör iakttas när man kombinerar kondroitin med warfarin (antikoagulant), eftersom det ökar risken för blödning.

