



*Magnesium bidrar till upprätthållandet av ben under normala förhållanden och upprätthållande av normal muskelfunktion.*

### DESCRIPCIÓN

#### Vad är Agiflex till för?

För underhåll av brosk.

Det hjälper till att smörja lederna och håller lederna flexibla.

#### När är det indicerat att ta Agiflex?

I fall av:

- Smärta.
- Ledstyvhet.
- Broskslitage.
- Begränsning av rörelse.
- Deformationer.
- Knastrar.

### Ingredienser

Maltodextrin, Peptiplus XP kollagen, magnesiumcitrat, Chondractiv™ (innehåller 55 % typ II kollagen, 12 % kondroitinsulfat och 2 % hyaluronsyra), apelsin smak, L-askorbinsyra, surhetsreglerande medel: citronsyra, natriumhyaluronat, sulfat\* , sötningsmedel: sukralos, kalcium D-pantotemat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminhydroklorid. \*Fiskbaserad produkt.

### Sammansättning

Per 1 skopa (10 g): Chondractiv™ 250 mg, kollagen 3000 mg, hyaluronsyra 25 mg, kondroitinsulfat 50 mg, vitamin B1 1,1 mg (100 % VRN\*), vitamin B2 1,4 mg (100 % NRV\*), vitamin B6 1,4 mg (100 % NRV\*), Pantotensyra 6 mg (100 % NRV\*), Vitamin C 80 mg (100 % NRV\*), Magnesium 56,25 mg (15 % NRV\*)





.\*Näringsämnen referensvärde.

### Bruksanvisning

1 skopa (10 g) per dag, löst i ett halvt glas vatten, te eller fruktjuice.

### Kontraindikationer

Rekommenderas inte vid graviditet och amning.

Användning bör undvikas hos astmatiker.

Kondroitinkonsumtion bör också undvikas hos patienter som har haft eller har haft ett återfall av prostatacancer.

### Läkemedelsinteraktioner och andra

Minimala biverkningar har beskrivits för kollagen, främst vissa gastrointestinala obehag, såsom en känsla av mättnad och obehaglig smak, och huvudvärk. Kondroitinsulfat är säkert för de flesta. I vissa fall kan det orsaka magsmärtor och illamående. Andra negativa effekter som diarré, förstoppning, svullna ögonlock, svullna ben, håravfall och oregelbunden hjärtrytm har rapporterats. Försiktighet bör iaktas när man kombinerar kondroitin med warfarin (antikoagulant), eftersom det ökar risken för blödning.

