

Glicofort 60 tabletter

EAN: 5605481108525 FABRICANTE: DIETMED



GLICOFORT är ett kosttillskott baserat på Nopal (Neopuntia®), Blåbär, Kanel, Quercetin, Magnesium, Zink, Krom och Vitamin D.

DESCRIPCIÓN

När är det indicerat att ta Glicofort?

- I regleringen av blodsocker.
- Aktiv modulator av insulinfunktion.
- För att upprätthålla ett hälsosamt kardiovaskulärt system.
- Vid diabetes.
- Normalisering av blodtrycket.
- För att förhindra aterosklerotiska processer.

Ingredienser

Magnesiumoxid, *Vaccinium myrtillus* (blåbär; koncentrerat fruktextrakt innehållande minst 25 % proantocyanidiner), *Opuntia ficus Indica* (Neopuntia®; torrextrakt av Nopal), *Cinnamomum zeylanicum* (kanel; torrextrakt 20:1), bulkmedel: mikrokristallin cellulosa, quercetin, klumpförebyggande medel: magnesiumsalter av fettsyror, zinkoxid, antiklumpningsmedel: kiseldioxid, kolekalciferol, kromklorid.

Samansättning

För 2 tabletter: Blåbär (25 % proantocyanidiner) 320 mg, Neopuntia® 200 mg, Kanel 150 mg (ekvivalent till 3 g), Quercetin 70 mg, Magnesium 375 mg (100 % NRV*), Zink 10 mg (100 % NRV*), Krom 40 µg (100 % NRV*), Vitamin D 5 µg (100 % NRV*). * Näringsreferensvärde.

Bruksanvisning

1 tablett 2 gånger om dagen, helst före måltid.

Kontraindikationer

Vid graviditet eller amning bör du rådfråga din läkare.



Glicofort 60 tabletter

EAN: 5605481108525 FABRICANTE: DIETMED



Långvarig användning av krom kan orsaka hudirritation, huvudvärk, yrsel, illamående, humörsvingningar och koncentrationssvårigheter, resonemang och koordinationsvårigheter. Höga doser är förknippade med allvarigare effekter som blodsjukdomar och njur- eller leverskador. Diabetiker måste kontrollera glukosvärdena. Krom och magnesium bör inte tas i överskott av personer som har njur- eller leverproblem. Överskott av magnesium kan påverka din hjärtfrekvens, sänka blodtrycket och orsaka mental förvirring. Överdrivna doser zink kan orsaka feber, hosta, magsmärtor och trötthet. Zink ska inte användas till individer med HIV. D-vitamin ska inte användas vid sarkoidos och histoplasmos. Patienter som ska genomgå operation bör sluta ta tranbär och kanel minst 2 veckor före, på grund av påverkan på blodsockernivåerna under och efter operationen.

Läkemedelsinteraktioner och andra

Krom interagerar med levotyroxin och samtidig användning med NSAID bör undvikas. Det kan också minska kroppens upptag av koppar och järn. Att ta vitamin C tillsammans gynnar dess absorption. Samtidig användning av magnesium och antibiotika, bisfosfonater, kalciumkanalblockerare, muskelavslappande medel och kaliumsparande diuretika bör undvikas.

