

Magnesiumcitrat + Q10 60 vcaps

EAN: 8437027176241 FABRICANTE: DISMAG



Kosttillskott som skyddar mot oxidativa skador och kardiovaskulär funktion.

DESCRIPCIÓN

Kombination av två organiska magnesiumsalter (Magnesium Citrate och Magnesium Bisglycinate) med hög absorptionsprofil tillsammans med Coenzym Q10. Den utmärkta absorptionsprofilen för dessa två organiska salter gör det till ett ledande alternativ när det gäller att kompensera för magnesiumbrist. Koenzym Q10, som finns i kroppen som en viktig antioxidant och en nyckelspelare i produktionen av ATP, kompletterar magnesium i aktiviteter som intensiv fysisk träning, muskuloskeletal hälsa eller andra processer där magnesium eller energiproduktion ingriper.

Dess funktion i kroppen är väsentlig på grund av dess roll i energiproduktionen, eftersom den är en del av kedjan genom vilken vår energi produceras i celler, och för dess antioxidantfunktion. Koenzym Q10 spelar en viktig roll i **skyddet mot oxidativ skada** och **kardiovaskulär funktion**. Det finns olika faktorer, såsom vissa mediciner, ålder, magsjukdomar, brist på vissa vitaminer, reaktion på stress, rökning eller alkoholkonsumtion som gör att våra reserver minskar, med dess konsekvenser. Dessutom kan CoQ10-nivåer minskas genom intensiv träning eller fysisk ansträngning eller överdriven ansträngning. I dessa processer ökar förbrukningen av CoQ10; och låga nivåer kan utlösa myalgi (muskelsmärta, särskilt i benen) på grund av CoQ10-brist.

Ingredienser per 1 kapsel

Magnesiumcitrat (30 % mg) 235 mg, magnesiumbisglycinat (11,5 % mg) 200,85 mg, vegetabilisk kapsel, bulkmedel (mikrokristallin cellulosa), koenzym Q10 (98 % CoQ10) 30,61 mg, torrextrakt av bambustammar, torrextrakt av bambustammen vegetabiliskt magnesiumstearat och magnesiumsalter av fettsyror).

Bruksanvisning

Ta en kapsel om dagen.

Näringsvärde

Näringsvärde	daglig dos	%VRN
Magnesium	94mg	25 %



Magnesiumcitrat + Q10 60 vcaps

EAN: 8437027176241 FABRICANTE: DISMAG



Koenzym Q10 30 mg

%NRV: Näringsreferensvärden

Varningar

Hos **antikoagulerade patienter**, innan de börjar använda det, bör de först rådgöra med sin läkare så att de tar hänsyn till det.

