

L-Histidin HCl 500 mg 30 kapslar

EAN: 5055148410957

FABRICANTE: LAMBERTS



L-Histidin HCl 500 mg. I fri form. Icke-essentiell aminosyra. Histidin används av kroppen för att göra proteiner och mer.

DESCRIPCIÓN

Aminosyror används av kroppen för att bygga proteiner.

Proteiner är väsentliga för bildandet av celler och är också kopplade till den biokemiska strukturen hos hormoner, enzymer, signalsubstanser och antikroppar.

Aminosyror klassificeras som essentiella eller icke-essentiella. Essentiella aminosyror kan inte syntetiseras i kroppen och måste erhållas genom kosten, medan icke-essentiella aminosyror, även om de är mycket viktiga för hälsan, kan syntetiseras i kroppen och därför inte klassificeras som "essentiella".

Aminosyrorna i LAMBERTS[®] presenteras i "fri form", det vill säga de är redo att tas upp och användas av kroppen (de behöver inte smältas).

Histidin anses vara en icke-essentiell aminosyra för vuxna, men kostkällor för histidin (kött, fisk och mejeriprodukter) representerar förmodligen majoriteten av den totala mängden som finns i kroppen.

Histidin används av kroppen för att göra proteiner och även som en prekursor till signalsubstansen histamin, som frisätts av kroppen vid allergiska reaktioner. Histidin är involverad i regleringen och användningen av flera viktiga mineraler i kroppen, inklusive zink, koppar, mangan och järn.

L-Histidin HCl från LAMBERTS[®] är i fri form, redo att tas upp av kroppen utan att behöva brytas ned av matsmältningsevenymer.

Vitt pulver i en klar hård kapsel.

Varje kapsel ger:

L-Histidin HCl 500 mg

Upplösningstid:



L-Histidin HCl 500 mg 30 kapslar

EAN: 5055148410957

FABRICANTE: LAMBERTS



Mindre än 30 minuter.

Allergen anmärkning

Följande lista över allergener är uteslutna: vete, gluten, korn, soja, ägg, mjölk och mejeriprodukter, laktos, nötter, sulfiter, selleri, fisk, skaldjur och jäst.

Försiktighetsåtgärder

Denna produkt rekommenderas inte för barn, växande ungdomar eller gravida eller ammande kvinnor.

Bruksanvisning

Ta 1 kapsel om dagen med vatten eller fruktjuice.

Aminosyror tas bäst en halvtimme före någon måltid eller precis innan du går och lägger dig.

Överskrid inte den uttryckligen rekommenderade dagliga dosen.

Med en behållare har du: max 30 dagar.

