

Colnatur Forte 30 Comp

EAN: 8426594107635 FABRICANTE: ORDESA



Suplemento alimentar à base de colágeno tipo II nativo, extrato de salgueiro, extrato de garra do diabo, ácido hialurônico e vitamina C.

DESCRIPCIÓN

Indicações

Especialmente indicado para cuidados articulares intensivos*.

* **Colnatur® FORTE** ajuda:

- **CARTILAGEM:** A vitamina C contribui para a formação normal de colágeno para o funcionamento normal da cartilagem.
- **OSSOS:** A vitamina C contribui para a formação normal de colágeno para o funcionamento normal dos ossos.

Colnatur® Forte apresenta-se na forma de comprimido bicamada de dupla ação:

- **Primeira camada:** Composta por colágeno tipo II nativo, ácido hialurônico e vitamina C, cuida das articulações*.
- **Segunda camada:** Composta por extrato de salgueiro ¹ e extrato de garra do diabo ², tradicionalmente utilizado para reduzir dores nas articulações.

Consulte o seu médico ou farmacêutico se você usa anticoagulantes orais ou se é alérgico a salicilatos.

Composição

Camada superior: agente de volume (celulose microcristalina), hialuronato de sódio (ácido hialurônico), colágeno nativo tipo II, ácido L-ascórbico (vitamina C), estabilizador (hidrogenofosfato de cálcio), estabilizador (polivinilpirrolidona), agente antiaglomerante (dióxido de cálcio). sílicio, estabilizador (estearato de magnésio), estabilizador (talco).



Colnatur Forte 30 Comp

EAN: 8426594107635 FABRICANTE: ORDESA



Camada inferior: extrato seco de salgueiro (*Salix alba L.* , casca) com 30% de salicina, extrato seco de harpagophytum (*Harpagophytum procumbens DC.* , raiz) com 2% de harpagosídeos, agente de volume (celulose microcristalina), estabilizador (polivinilpirrolidona), estabilizador (hidrogenofosfato de cálcio), estabilizador (estearato de magnésio), agente antiaglomerante (dióxido de silício).

Revestimento: agente de revestimento (hidroxipropilmetilcelulose), agente de volume (celulose microcristalina), estabilizador (ácido esteárico).

Sem gorduras, açúcares, corantes artificiais ou glúten.

Comprimido bicamada.

Instruções de uso

Tomar 1 comprimido por dia com água, fora das refeições (meia hora antes ou pelo menos 2 horas depois de comer).

