

Agiflex 20 Ampullen

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



AGIFLEX is een voedingssupplement op basis van Chondractiv™ (bevat 55% collageen type II, 12% chondroïtinesulfaat en 2% hyaluronzuur), dat wil zeggen een gepatenteerde combinatie van elementen met een uitgesproken chondroprotectieve werking.

DESCRIPCIÓN

Waar is Agiflex voor?

Voor het behoud van kraakbeen.

Het helpt de gewrichten te smeren en houdt de gewrichten soepel.

Wanneer is het geïndiceerd om Agiflex te gebruiken?

In gevallen van:

- Pijn.
- Gezamenlijke stijfheid.
- Kraakbeen slijtage.
- Beperking van beweging.
- Vervormingen.
- Gekraak.

Ingredienten

Water, fructose, druivenconcentraat, gehydrolyseerd zeecollageen*, chondroïtinesulfaat*, Chondractiv™ (bevat 55% type II collageen, 12% chondroïtinesulfaat en 2% hyaluronzuur), L-ascorbinezuur, bioflavonoïden, natriumhyaluronaat, sinaasappelsmaak, zuurteregelaar: citroenzuur, conserveermiddel: kaliumsorbaat, naringine. *Product op basis van vis.

Samenstelling Per 1 ampul:

- Chondractiv™ 250 mg (bevat 55% type II collageen, 12% chondroïtinesulfaat en 2% hyaluronzuur).
- Totaal collageen 900 mg.



Agiflex 20 Ampullen

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



- Totaal chondroïtinesulfaat 300 mg.
- Totaal hyaluronzuur 45 mg.
- Vitamine C 120 mg (150% NRV*).
- Bioflavonoïden 100 mg.
- Naringine 10 mg.

*Referentiewaarde van voedingsstoffen.

Sinaasappel smaak.

Instructies voor gebruik

1 ampul per dag, bij voorkeur vóór het ontbijt. Het kan worden opgelost in water of vruchtensap.

Contra-indicaties

Niet aanbevolen in geval van zwangerschap en borstvoeding.

Gebruik bij astmapatiënten moet worden vermeden.

De consumptie van chondroïtine moet ook worden vermeden bij patiënten die prostaatkanker hebben gehad of opnieuw hebben gehad.

Geneesmiddelinteracties en anderen

Er zijn minimale bijwerkingen beschreven voor collageen, voornamelijk wat maag-darmklachten, zoals een gevoel van volheid en een onaangename smaak, en hoofdpijn. Chondroïtinesulfaat is voor de meeste mensen veilig. In sommige gevallen kan het maagpijn en misselijkheid veroorzaken. Andere bijwerkingen zoals diarree, constipatie, gezwollen oogleden, gezwollen benen, haaruitval en onregelmatige hartslag zijn gemeld. Voorzichtigheid is geboden bij het combineren van chondroïtine met warfarine (antistollingsmiddel), omdat dit het risico op bloedingen verhoogt.

