

Agiflex 40 capsules

EAN: 5605481107306 FABRICANTE: DIETMED



Vitamine C draagt bij tot de normale vorming van collageen voor de normale werking van kraakbeen.

DESCRIPCIÓN

Waar is Agiflex voor?

Voor het behoud van kraakbeen.

Het helpt de gewrichten te smeren en houdt de gewrichten soepel.

Wanneer is het geïndiceerd om Agiflex te gebruiken?

In gevallen van:

- Pijn.
- Gezamenlijke stijfheid.
- Kraakbeen slijtage.
- Beperking van beweging.
- Vervormingen.
- Gekraak.

Ingrediënten

Chondractiv™ (bevat 55% collageen type II, 12% chondroïtinesulfaat en 2% hyaluronzuur), vulstof: microkristallijne cellulose, zeecollageen*, gelatine, L-ascorbinezuur, quercetine, natriumhyalonaat, chondroïtinesulfaat*, naringine, anti-klontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide.

Samenstelling

Voor 2 capsules: Chondractiv™ 500 mg, Collageen 500 mg, Hyaluronzuur 50 mg, Chondroïtinesulfaat 100 mg, Vitamine C 80 mg (100% VRN*), Quercetine 60 mg, Naringin 20 mg. *Referentiewaarde van voedingsstoffen.

Instructies voor gebruik

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241122
<https://bio-farma.es/kopen/f/dietmed/agiflex-40-capsules>



Agiflex 40 capsules

EAN: 5605481107306 FABRICANTE: DIETMED



2 maal daags 1 capsule, bij voorkeur vóór het ontbijt en vóór het avondeten.

Contra-indicaties

Niet aanbevolen in geval van zwangerschap en borstvoeding.

Gebruik bij astmapatiënten moet worden vermeden. De consumptie van chondroïtine moet ook worden vermeden bij patiënten die prostaatkanker hebben gehad of opnieuw hebben gehad.

Geneesmiddelinteracties en anderen

Er zijn minimale bijwerkingen beschreven voor collageen, voornamelijk enig maag-darmklachten, zoals een gevoel van volheid en een onaangename smaak, en hoofdpijn. Chondroïtinesulfaat is voor de meeste mensen veilig. In sommige gevallen kan het maagpijn en misselijkheid veroorzaken. Andere bijwerkingen zoals diarree, constipatie, gezwollen oogleden, gezwollen benen, haaruitval en onregelmatige hartslag zijn gemeld. Voorzichtigheid is geboden bij het combineren van chondroïtine met warfarine (antistollingsmiddel), omdat dit het risico op bloedingen verhoogt.

