



Magnesium draagt bij tot het behoud van botten onder normale omstandigheden en tot het behoud van een normale spierfunctie.

DESCRIPCIÓN

Waar is Agiflex voor?

Voor het behoud van kraakbeen.

Het helpt de gewrichten te smeren en houdt de gewrichten soepel.

Wanneer is het geïndiceerd om Agiflex te gebruiken?

In gevallen van:

- Pijn.
- Gezamenlijke stijfheid.
- Kraakbeen slijtage.
- Beperking van beweging.
- Vervormingen.
- Gekraak.

Ingredienten

Maltodextrine, Peptiplus XP collageen, magnesiumcitraat, Chondractiv™ (bevat 55% type II collageen, 12% chondroïtinesulfaat en 2% hyaluronzuur), sinaasappelsmaak, L-ascorbinezuur, zuurteregelaar: citroenzuur, natriumhyalonaat, chondroïtinesulfaat*, zoetstof: sucralose, Calcium-d-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, thiaminehydrochloride. *Product op basis van vis.

Samenstelling

Per 1 maatschepje (10 g): Chondractiv™ 250 mg, Collageen 3000 mg, Hyaluronzuur 25 mg, Chondroïtinesulfaat 50 mg, Vitamine B1 1,1 mg (100% VRN*), Vitamine B2 1,4 mg (100% NRV*), Vitamine B6 1,4 mg (100% NRV*), pantotheenzuur 6 mg (100% NRV*), Vitamine C 80 mg (100% NRV*), Magnesium





56,25 mg (15% NRV*). *Nutriëntenreferentiewaarde.

Instructies voor gebruik

1 maatschepje (10 g) per dag, opgelost in een half glas water, thee of vruchtensap.

Contra-indicaties

Niet aanbevolen in geval van zwangerschap en borstvoeding.

Gebruik bij astmapatiënten moet worden vermeden.

De consumptie van chondroïtine moet ook worden vermeden bij patiënten die prostaatkanker hebben gehad of opnieuw hebben gehad.

Geneesmiddelinteracties en anderen

Er zijn minimale bijwerkingen beschreven voor collageen, voornamelijk enig maag-darmklachten, zoals een gevoel van volheid en een onaangename smaak, en hoofdpijn. Chondroïtinesulfaat is veilig voor de meeste mensen. In sommige gevallen kan het maagpijn en misselijkheid veroorzaken. Andere bijwerkingen zoals diarree, constipatie, gezwollen oogleden, gezwollen benen, haaruitval en onregelmatige hartslag zijn gemeld. Voorzichtigheid is geboden bij het combineren van chondroïtine met warfarine (antistollingsmiddel), omdat dit het risico op bloedingen verhoogt.

