

Glicofort 60 tabletten

EAN: 5605481108525 FABRICANTE: DIETMED



GLICOFORT is een voedingssupplement op basis van Nopal (Neopuntia®), Bosbes, Kaneel, Quercetine, Magnesium, Zink, Chroom en Vitamine D.

DESCRIPCIÓN

Wanneer is het geïndiceerd om Glicofort in te nemen?

- Bij de regulatie van de bloedglucose.
- Actieve modulator van de insulinefunctie.
- Voor het behoud van een gezond cardiovasculair systeem.
- Bij suikerziekte.
- Normalisatie van de bloeddruk.
- Bij de preventie van atherosclerotische processen.

Ingrediënten

Magnesiumoxide, *Vaccinium myrtillus* (Bosbes; geconcentreerd extract van de vrucht met minstens 25% proanthocyanidinen), *Opuntia ficus Indica* (Neopuntia®; droog extract van Nopal), *Cinnamomum zeylanicum* (Kaneel; droog extract 20:1), vulstof: microkristallijn cellulose, quercetine, antiklontermiddel: magnesiumzouten van vetzuren, zinkoxide, antiklontermiddel: siliciumdioxide, cholecalciferol, chroomchloride.

Samenstelling

Voor 2 tabletten: Bosbes (25% proanthocyanidinen) 320 mg, Neopuntia® 200 mg, Kaneel 150 mg (overeenkomend met 3 g), Quercetine 70 mg, Magnesium 375 mg (100% NRV*), Zink 10 mg (100% NRV*), Chroom 40 µg (100% NRV*), Vitamine D 5 µg (100% NRV*). * Nutriëntenreferentiewaarde.

Instructies voor gebruik

2 maal daags 1 tablet, bij voorkeur vóór de maaltijd.

Contra-indicaties



Glicofort 60 tabletten

EAN: 5605481108525 FABRICANTE: DIETMED



In geval van zwangerschap of borstvoeding dient u uw arts te raadplegen.

Langdurig gebruik van chroom kan huidirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, stemmingswisselingen en concentratie-, redeneer- en coördinatieproblemen veroorzaken. Hoge doses worden in verband gebracht met ernstiger effecten, zoals bloedstoornissen en nier- of leverschade. Mensen met diabetes moeten de glucosewaarden controleren. Chroom en magnesium mogen niet in overmaat worden ingenomen door personen met nier- of leverproblemen. Een teveel aan magnesium kan uw hartslag beïnvloeden, de bloeddruk verlagen en mentale verwarring veroorzaken. Overmatige doses zink kunnen koorts, hoesten, maagpijn en vermoeidheid veroorzaken. Zink mag niet worden gebruikt bij personen met HIV. Vitamine D mag niet worden gebruikt bij sarcoïdose en histoplasmose. Patiënten die een operatie moeten ondergaan, moeten minimaal 2 weken van tevoren stoppen met het gebruik van cranberry en kaneel, vanwege de invloed op de bloedsuikerspiegel tijdens en na de operatie.

Geneesmiddelinteracties en anderen

Chroom heeft een wisselwerking met levothyroxine en gelijktijdig gebruik met NSAID's moet worden vermeden. Het kan ook de opname van koper en ijzer door het lichaam verminderen. Het samen nemen van vitamine C bevordert de opname ervan. Het gelijktijdige gebruik van magnesium met antibiotica, bisfosfonaten, calciumantagonisten, spierverslappers en kaliumsparende diuretica moet worden vermeden.

