

Nodacil Gel 15 ml x 10 enveloppen

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Snelle en effectieve verlichting van symptomen die verband houden met maagzuur.

DESCRIPCIÓN

Wat is Nodacil?

Het is een voedingssupplement op basis van Magnesium met zoetstoffen.

Waar is Nodacil voor?

Nodacil Gel bevat magnesium dat bijdraagt aan de elektrolytenbalans en is daarom nuttig voor de maagzuurgraad.

Hoe neemt u Nodacil in?

Neem één zakje 30-60 minuten na de hoofdmaaltijd.

Aanbevolen dagelijkse dosis: 1-2 zakjes.

Schudden voordat u het opent.

Voordelen van het gebruik van Nodacil

Het gevoel van brandend maagzuur na de maaltijd wordt veroorzaakt door het terugvloeien van de maaginhoud, die zuur is, naar de slokdarm (een orgaan dat niet is voorbereid om zuren te bevatten).

Dit gebeurt als gevolg van een storing in het barrièremechanisme dat de slokdarm van de maag scheidt. De factoren die een slechte werking van de onderste slokdarmsfincter bevorderen zijn talrijk en gevarieerd, zoals liggen na het eten, zwaarlijvigheid, tabak en alcohol, grote maaltijden, stress, het dragen van strakke kleding in de taille, sommige medicijnen, bepaalde ziekten zoals hiatale hernia en sommige voedingsmiddelen zoals koffie, thee, cola, koolzuurhoudende dranken, chocolade, munt, citrusvruchten, knoflook, peper...

Nodacil Gel is uw snelle en effectieve verlichting van symptomen die verband houden met maagzuur.

Waaruit bestaat Nodacil?

Nodacil Gel bevat magnesiumzouten (magnesiumcarbonaat en magnesiumtrisilicaat), calciumzouten (calciumcarbonaat), natriumalgiinaat, pectines, xanthaangom en etherische olie van pepermunt.



Nodacil Gel 15 ml x 10 enveloppen

EAN: 8425652550611 **FABRICANTE:** NOVADIET



Ingrediënten

Water, Vulstof (magnesiumtrisilicaat), Magnesiumcarbonaat, Zuurteregelaar (calciumcarbonaat), Gemodificeerd maïszetmeel, Geleermiddelen (microkristallijne cellulose, carboxymethylcellulose, pectine, xanthaangom, natriumalginaat), Essentiële olie van pepermunt, Zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), Conserveermiddelen (natriumbenzoaat, kaliumsorbaat).

Actieve ingrediënten

Voor 1 zakje:

Magnesium: 125 mg (33% NRV*).

Voor 2 enveloppen:

Magnesium: 250 mg (66% NRV*).

*NRV: referentiewaarden voor voedingsstoffen.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik dit voedingssupplement niet als u allergisch of intolerant bent voor één van de ingrediënten.

Het gebruik ervan wordt niet aanbevolen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Houd rekening met het innemen van Nodacil Gel en het innemen van medicijnen, minimaal 1 uur.

Neem het product met veel water in, zodat de stof de maag bereikt. Waarschuwing voor verstikkingsgevaar voor mensen met slikproblemen. Vermijd consumptie samen met medicijnen en andere voedingssupplementen op basis van vezels.

