

Nigelone Oil 30 ml.

EAN: FABRICANTE: ANAGALIDE



Aceite cosmético para el masaje muscular y articular, que contiene Aceite de semillas de Comino negro (Nigella sativa) con alto contenido en Timoquinona, Aceite de semillas de Jojoba (Simmondsia chinensis) y Tocoferoles naturales.

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES:

- Para el masaje muscular y articular.
- El aceite de semillas de Comino negro contiene un aceite fijo (principalmente ácidos grasos insaturados) y un aceite volátil (con los insaponificables: Timoquinoa y otros). Ambos son los mayores responsables de sus efectos cosmecéuticos: control del engrosamiento de la epidermis y de la inflamación con reducción del dolor, particularmente cuando está asociado a la osteoartritis, la mastalgia, y en la psoriasis (asociado a los medicamentos usuales).
- También contribuye a la repigmentación de la piel.
- El aceite de las semillas de Jojoba, que contiene ésteres en lugar de triglicéridos, sirve como diluyente del aceite de las semillas de Comino negro y a la par ayuda, con sus propiedades similares al sebo natural, a penetrar el estrato córneo y previene la pérdida de agua además de estimular la formación de colágeno.
- Los Tocoferoles naturales aportan la capacidad antioxidante necesaria para mantener los aceites sin oxidación.

MODO DE EMPLEO:

Uso externo. Aplicar dos o tres veces al día en la zona afectada, realizando un masaje suave con movimientos circulares hasta su absorción completa.

INGREDIENTES:

Nigella sativa seed oil, Simmondsia chinensis seed oil, Tocopherol.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Conservar en sitio fresco y fuera del alcance de la luz.

ADVERTENCIAS:







Nigelone Oil 30 ml.

EAN: FABRICANTE: ANAGALIDE



- Evitar el contacto con los ojos.
- Aplicar sobre la piel limpia y seca.
- No aplicar sobre la piel irritada o lesionada.
- No aplicar sobre mucosas.
- En algún caso, puede darse hipersensibilidad a uno o varios componentes. probar primero en una pequeña superfície de la piel.
- Lavar las manos después de la aplicación.

PAO (Período después de la apertura): 12 meses.

En algún caso, puede darse hipersensibilidad a uno o varios componentes. Probar primero en una pequeña superficie de la piel.



