



AGIFLEX es un complemento alimenticio a base de Chondractiv™ (contiene 55% de colágeno Tipo II, 12% Sulfato de Condrotina y 2% de Ácido Hialurónico), es decir, una combinación patentada de elementos que tienen una marcada acción condroprotector.

DESCRIPCIÓN

¿Para qué sirve Agiflex?

Para el mantenimiento del cartílago.

Ayuda a lubricar las articulaciones y mantiene las articulaciones flexibles.

¿Cuándo está indicado tomar Agiflex?

En los casos de:

- Dolor.
- Rigidez articular.
- Desgaste del cartílago.
- Limitación del movimiento.
- Deformaciones.
- Crepitaciones.

Ingredientes

Agua, fructosa, concentrado de uva, colágeno marino hidrolizado*, sulfato de condrotina*, Chondractiv™ (conteniendo 55% de Colágeno Tipo II, 12% de Sulfato de Condrotina y 2% de Ácido Hialurónico), ácido L-ascórbico, bioflavonoides, hialuronato de sodio, aroma de naranja, regulador de acidez: ácido cítrico, conservante: sorbato de potasio, naringina. *Producto a base de pescado.

Composición Por 1 ampolla:

- Chondractiv™ 250 mg (conteniendo 55% de Colágeno Tipo II, 12% de Sulfato de Condrotina y 2% de Ácido Hialurónico).



Agiflex 20 Ampollas

EAN: 5605481101199 FABRICANTE: DIETMED



- Colágeno total 900 mg.
- Sulfato de Condroitina total 300 mg.
- Ácido Hialurónico total 45 mg.
- Vitamina C 120 mg (150% VRN*).
- Bioflavonoides 100 mg.
- Naringina 10 mg.

*Valor de Referencia de Nutrientes.

Sabor a naranja.

Modo de empleo

1 ampolla al día, preferentemente antes del desayuno. Puede ser disuelta en agua o en zumo de frutas.

Contraindicaciones

No recomendado en caso de embarazo y lactancia.

Se debe evitar el uso en los asmáticos.

También se debe evitar el consumo de condroitina en pacientes que han tenido o que tienen una recurrencia de cáncer de próstata.

Interacciones Medicamentosas y otras

Están descritos efectos adversos mínimos para el colágeno, principalmente cierta incomodidad gastrointestinal, como sensación de saciedad y de sabor desagradable, y dolor de cabeza. El sulfato de condroitina es seguro para la mayoría de las personas. En algunos casos puede causar dolor gástrico y náuseas. Se han registrado otros efectos adversos como diarrea, estreñimiento, párpados hinchados, piernas hinchadas, pérdida de cabello y latido cardíaco irregular. Se debe tener cuidado al asociar la condroitina a la warfarina (anticoagulante), porque aumenta el riesgo de hemorragia.

