



El Magnesio contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al mantenimiento de la función muscular normal.

DESCRIPCIÓN

¿Para qué sirve Agiflex?

Para el mantenimiento del cartílago.

Ayuda a lubricar las articulaciones y mantiene las articulaciones flexibles.

¿Cuándo está indicado tomar Agiflex?

En los casos de:

- Dolor.
- Rigidez articular.
- Desgaste del cartílago.
- Limitación del movimiento.
- Deformaciones.
- Crepitaciones.

Ingredientes

Maltodextrina, colágeno Peptiplus XP, citrato de magnesio, Chondractiv™ (conteniendo 55% de Colágeno Tipo II, 12% de Sulfato de Condroitina y 2% de Ácido Hialurónico), aroma de naranja, ácido L-ascórbico, regulador da acidez: ácido cítrico, hialuronato de sodio, sulfato de condroitina*, edulcorante: sucralose, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina. *Producto a base de pescado.

Composición

Por 1 medida (10 g): Chondractiv™ 250 mg, Colágeno 3000 mg, Ácido Hialurónico 25 mg, Sulfato de Condroitina 50 mg, Vitamina B1 1,1 mg (100% VRN*), Vitamina B2 1,4 mg (100% VRN*), Vitamina B6 1,4





mg (100% VRN*), Ácido Pantoténico 6 mg (100% VRN*), Vitamina C 80 mg (100% VRN*), Magnesio 56,25 mg (15% VRN*). *Valor de Referencia de Nutrientes.

Modo de empleo

1 dosificador (10 g) al día, disuelto en medio vaso de agua, té o en zumo de frutas.

Contraindicaciones

No recomendado en caso de embarazo y lactancia.

Se debe evitar el uso en los asmáticos.

También se debe evitar el consumo de condroitina en pacientes que han tenido o que tienen una recurrencia de cáncer de próstata.

Interacciones Medicamentosas y otras

Están descritos efectos adversos mínimos para el colágeno, principalmente cierta incomodidad gastrointestinal, como sensación de saciedad y de sabor desagradable, y dolor de cabeza. El sulfato de condroitina es seguro para la mayoría de las personas. En algunos casos puede causar dolor gástrico y náuseas. Se han registrado otros efectos adversos como diarrea, estreñimiento, párpados hinchados, piernas hinchadas, pérdida de cabello y latido cardíaco irregular. Se debe tener cuidado al asociar la condroitina a la warfarina (anticoagulante), porque aumenta el riesgo de hemorragia.

