

Tensicor 60 comprimidos

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



Suplemento alimentar para hipertensão e para um sistema cardiovascular saudável.

DESCRIPCIÓN

Para que é indicado o Tensicor?

- Para manter a pressão arterial saudável.
- Modulador ativo para fluxo sanguíneo saudável.
- Hipertensão arterial.

Ingredientes

Olea europaea (azeitona; extrato de folha de oliveira EFLA 943®), *Crataegus oxyacantha* (espinheiro; extrato concentrado contendo pelo menos 18,75% de OPC), *Allium sativum* (alho; extrato seco 3:1), ácido L-ascórbico, agente de volume: celulose microcristalina, antiaglomerante: sais de magnésio de ácidos graxos, D-alfa-tocoferol 50%, antiaglomerante: dióxido de silício, selenito de sódio.

Composição

Para 2 comprimidos: Extrato de Folha de Oliveira EFLA 943® 700 mg, Alho (1% aliína) 500 mg, Espinheiro (18,75% OPC) 400 mg, Vitamina C 100 mg (125% NRV *), Vitamina E 12 mg α -TE (100% VRN*), Selênio 55 μ g (100% VRN*). *Valor de Referência dos Nutrientes.

Instruções de uso

1 comprimido 2 vezes ao dia, de preferência após as refeições.

Contra-indicações

Não use em caso de gravidez e lactação.

O consumo excessivo de Hawthorn pode causar depressão respiratória e cardíaca. Não deve ser utilizado nos primeiros 3 meses de gravidez, nem em crianças menores de 6 anos.

O consumo excessivo de alho pode causar irritações gastrointestinais, reações alérgicas e aumentar o



Tensicor 60 comprimidos

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



risco de sangramento. O alho é contraindicado em caso de sangramento ativo, pré e pós-operatório e em trombocitopenia. Você deve evitar consumir vitamina E e vitamina C em caso de angioplastia. O consumo excessivo de vitamina E pode causar sangramento. O consumo excessivo de selênio pode causar sintomas como queda de cabelo, manchas brancas nas unhas, fadiga, irritabilidade e gosto metálico.

Interações medicamentosas e outras

Devido à presença de Hawthorn, não deve ser associado a heterosídeos cardiotônicos, betabloqueadores, hipotensores ou benzodiazepínicos. Devido à presença do alho, não deve ser associado a anticoagulantes, antiplaquetários, anticoncepcionais orais e medicamentos metabolizados pelo fígado. A vitamina E interage com medicamentos metabolizados pelo fígado. O selênio pode interagir com medicamentos hipotensores, sedativos e varfarina.

