

Carbonato Magnesio 120 Comprimidos

EAN: 8435110851778 FABRICANTE: NATURLIDER



El Carbonato de Magnesio Naturlider en comprimidos restablece el equilibrio electrolítico en nuestro organismo, también tiene un efecto laxante porque facilita la evacuación intestinal. Debido a su contenido en magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve el Carbonato de Magnesio Naturlider?

El **Carbonato de Magnesio de Naturlider** en comprimidos es un complemento alimenticio con un alto contenido en magnesio, ello ayuda a disminuir el **cansancio** y la **fatiga**.

Por otro lado, el carbonato de magnesio Naturlider contribuye:

- Al equilibrio electrolítico.
- Al metabolismo energético normal.
- Al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- Al funcionamiento normal de los músculos.
- A la síntesis proteica normal.
- A la función psicológica normal.
- Al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- Al mantenimiento de los dientes en condiciones normales.
- Al proceso de división celular.
- A disminuir el cansancio y la fatiga.

¿Cuáles son las indicaciones del Carbonato de Magnesio Naturlider?

El Carbonato de Magnesio Naturlider esta indicado para:

- Estreñimiento: mejora del tránsito intestinal.
- Acidez estomacal.
- Estados carenciales de magnesio (vejez, ansiedad, calambres, tics, contracturas).
- Ayuda en cansancio y fatiga.
- Mantener en buen estado y reparar el desgaste de los cartílagos, tendones y huesos.

¿Tiene el Carbonato de Magnesio Naturlider Interacciones, efectos secundarios o Contraindicaciones?

Consultar al profesional en caso de embarazo o lactancia, si está en tratamiento con medicación o



Carbonato Magnesio 120 Comprimidos

EAN: 8435110851778 **FABRICANTE:** NATURLIDER



presenta unas condiciones médicas especiales.

¿Puede el carbonato de Magnesio de Naturlider interactuar con algún medicamento?

Los suplementos de magnesio pueden interactuar o interferir con algunos medicamentos. Por ejemplo:

- Los bisfosfonatos, empleados para tratar la osteoporosis, no se absorben bien cuando se toman sin que pase suficiente tiempo (antes o después) de la ingestión de suplementos dietéticos o medicamentos con altas cantidades de magnesio.
- Los antibióticos podrían no ser absorbidos si se toman sin que pase suficiente tiempo (antes o después) de la ingestión de un suplemento dietético con magnesio.
- Los diuréticos pueden aumentar o reducir la pérdida de magnesio a través de la orina, según el tipo de diurético.
- Los medicamentos recetados para aliviar síntomas de reflujo ácido o para tratar la úlcera péptica pueden causar niveles bajos de magnesio en la sangre cuando se toman por un período prolongado.
- Las dosis muy altas de suplementos de zinc pueden interferir con la capacidad del cuerpo de absorber y regular el magnesio.

