

Nodacil Gel 15 ml x 10 Sobres

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Alivio rápido y eficaz de los síntomas relacionados con la acidez gástrica.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es Nodacil?

Es un complemento alimenticio a base de Magnesio con edulcorantes.

¿Para qué sirve Nodacil?

Nodacil Gel contiene magnesio que contribuye al equilibrio electrolítico, por lo tanto sirve para la acidez gástrica.

¿Cómo tomar Nodacil?

Tome un sobre entre 30-60 minutos después de las principales comidas.

Dosis diaria recomendada: 1-2 sobres.

Agite antes de abrir.

Beneficios de tomar Nodacil

La sensación de acidez tras las comidas la produce el reflujo del contenido gástrico, que es ácido, al esófago (un órgano no preparado para contener ácidos).

Esto ocurre por un fallo en el mecanismo de barrera que separa el esófago del estómago. Los factores que favorecen el mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior son numerosos y variados como tumbarse después de haber comido, la obesidad, el tabaco y el alcohol, las comidas abundantes, el estrés, llevar ropa ajustada en la cintura, algunos fármacos, ciertas enfermedades como la hernia de hiato y algunos alimentos como el café, té, refrescos de cola, bebidas con gas, chocolate, menta, cítricos, ajo, pimiento...

Nodacil Gel es tu alivio rápido y eficaz de los síntomas relacionados con la acidez gástrica.

¿De qué se compone Nodacil?

Nodacil Gel contiene sales de magnesio (Carbonato de magnesio y trisilicato de magnesio) sales de calcio (carbonato cálcico), Alginato sódico, pectinas, goma xantana y Aceite esencial de menta.

Ingredientes



Nodacil Gel 15 ml x 10 Sobres

EAN: 8425652550611 FABRICANTE: NOVADIET



Agua, Agente de carga (trisilicato magnésico), Carbonato de magnesio, Corrector de acidez (carbonato cálcico), Almidón modificado de maíz, Gelificantes (celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa, pectina, goma xantana, alginato sódico), Aceite esencial de menta, Edulcorantes (acesulfame K, sucralosa), Conservadores (benzoato sódico, sorbato potásico).

Ingredientes Activos

Por 1 sobre:

Magnesio: 125 mg (33% VRN*).

Por 2 sobres:

Magnesio: 250 mg (66% VRN*).

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Precauciones

No tome este complemento alimenticio si es alérgico o intolerante a alguno de sus ingredientes.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

Separe la toma de Nodacil Gel de la toma de medicamentos, al menos 1 hora.

Tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia llega al estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

