



Papiloxyl (VPH) a base de vitaminas, minerales, hongos y lactobacillus está indicado especialmente para reforzar el sistema inmunitario en caso de padecer el virus del papiloma humano. De laboratorios Papiloxyl.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es Papiloxyl?

Papiloxyl es un complemento alimenticio a base de vitaminas, minerales y otros componentes: hongos y lactobacillus **Reishi** (Ganoderma Lucidum) , y **Shiitake** (Lentula Edades); y los lactobacillus: **Lactobacillus Gasseri** , **Lactibacilus Rhamosus**; además de la **Lactoferrina**.

¿Cómo se toma papiloxyl?

Papiloxyl se toma vía oral: Tomar de una a tres cápsula al día, con un vaso de agua, treinta minutos antes de las comidas principales.

¿Qué composición tiene papiloxyl?

La composición de Papiloxyl es: Extracto seco Reishi (Ganoderma Lucidum) \geq 50% polisacáridos, setas 750,00mg; Extracto seco Shiitake (Lentinus Edodes) \geq 6% polisacáridos, fruto entero 750,00mg; Lactoferrina 75,00mg; Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) 36,63mg 7,32E+9 UFC; Citrato de zinc 29,01mg (9mg de zinc 89,94%VRN*); Vitamina C (ácido L-ascórbico) 39,00mg 48,75%VRN*; Lactobacillus gasseti (Lg-36) 18,63mg 3,726E+9 UFC; Estearato de magnesio y Dióxido de silicio; Vitamina B9 (Ácido fólico) 0,30 mg 150%VRN*; Vitamina A (acetato 500.000UI) 0,348mg 43,5%VRN*; Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1,2mcg 48%VRN*.

¿Qué es el virus del papiloma humano (VPH)?

El virus del papiloma humano es un virus que todos los hombres y mujeres sexualmente activos pueden contraer en algún momento de su vida.

¿Cuáles son los síntomas del virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano no produce síntomas a no ser que esté en un momento avanzado, entonces podría haber flujo más abundante de lo normal, periodo más abundante de lo normal, sangrado después





de mantener relaciones, verrugas genitales o anales.

¿Cómo se transmite el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano se transmite vía sexual.

¿Qué tratamiento hay para el virus del papiloma humano?

EL mejor tratamiento para el virus del papiloma humano es reforzar el sistema inmunitario y durante los seis primeros meses después del diagnóstico mantener relaciones sexuales con preservativo, normalmente el cuerpo lo elimina.

¿Se puede volver a tener el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano se puede tener pero se trataría de otro genotipo.

¿Voy a tener cáncer?

Sólo varios genotipos producen cáncer, en el cuello uterino o la zona anorectal, fundamentalmente. El VPH causa el 99,9 % de los casos de cáncer de cuello de útero. También causa cáncer de ano, de cabeza de cuello (cavidad orofaríngea). Pero los virus de alto riesgo oncológico son muchos menos que los de bajo riesgo y, por eso, menos frecuentes. En concreto, los más estudiados son los tipos 16 y 18.

¿Cómo se puede prevenir el virus del papiloma humano?

El virus del papiloma humano se puede prevenir con la utilización de preservativo y mediante vacunas, administradas antes de la primera relación sexual.

La Dra. Montiel nos indica que la estimulación y refuerzo de la actividad del sistema inmune, es crucial para detectar la infección, mantenerla asintomática e incluso eliminar el virus. "Al igual que en otras infecciones virales, como ocurre con el VPH si las defensas del cuerpo son débiles, estos virus escapan de los mecanismos de control inmunitario y aparecen enfermedades".

PAPILOXYL es con complemento alimenticio de última generación patentado, resultado de varios años de investigación y desarrollo. Sus reconocidos componentes nutricionales lo convierten en un potente coadyuvante del Sistema inmunológico, de las síntesis normal del ADN y la protección de las células frente



Papiloxyl 30 Caps

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



al daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO:

1. VPH (HPV) test +: Citologías L-SIL, H-SIL, ASCUS, condilomas ó verrugas, 3 cápsulas al día (1-1-1) 30 minutos antes de las principales comidas, durante 6 meses mínimo hasta negativizarse el VPH/HPV.
2. Prevención o Mantenimiento después de negativizar VPH/HPV: 1 cápsula al día 30 minutos antes de una comida durante 6 meses. (1-0-0).

