

## Babybiane Imedia 7 Sobres

EAN: 3701145600076 FABRICANTE: PILEJE



Babybiane Imedia es un fermento láctico de Pileje. Babybiane sirve para tratar diarreas agudas del lactante, ya sean gastroenteritis agudas o diarreas asociadas a la toma de antibióticos. Babybiane Imedia está indicado para niños de 0 a 4 años.

### DESCRIPCIÓN

**Babybiane Imedian** es un complemento alimenticio de **Pileje**, sirve para el tratamiento de **gastroenteritis agudas** y **diarreas** asociadas a la **toma de antibióticos** para lactantes y niños hasta cuatro años, siempre bajo recomendación médica.

**Ingredientes de Babybianes Imedian Pileje:** Maltodextrina, y una cepa microbiana dosificada a 10 000 millones por sobre: *Lactobacillus rhamnosus* GG LA801.

### Análisis nutricional de Babybiane Imedia

	Análisis medio	Por 100 g	Por sobre
Valor energético	(kJ)	1659	25
Valor energético	(kcal)	390	6
Materia grasa	(g)	< 0,5	0
_de los cuales, ácidos grasos saturados	(g)	0	0
Glúcidos	(g)	93	1,4
_de los cuales, azúcares	(g)	3,4	< 0,5
Proteínas	(g)	3,6	< 0,5
Sal	(g)	0,62	< 0,01

La lista de ingredientes y los valores analíticos pueden cambiar y se dan en función de la información de que disponemos en este momento.

Antes de utilizar un producto PiLeje, consulte el envase para asegurarse de que su composición se adapta a su utilización personal.



## Babybiane Imedia 7 Sobres

EAN: 3701145600076 FABRICANTE: PILEJE



### Modo de empleo de Baby Imedia

1 sobre al día, diluido en un biberón o un vaso de 150 a 200 ml de una bebida fría o tibia, o mezclado con un alimento adecuado para el niño. Tomar preferentemente antes de una comida.

**Precauciones de Babybiane Imedia:** Babybiane Imedia debe utilizarse únicamente bajo control médico. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de preguntas. No puede constituir la única fuente de alimentación. No puede utilizarse por vía parenteral. Se ha formulado específicamente para responder a las necesidades nutricionales de los lactantes y los niños pequeños (hasta los 4 años incluidos) que padecen diarrea aguda (causada por una gastroenteritis aguda o la toma de antibióticos).

